

30錠 [5日分]

すっきり
服用感

【飲みやすい錠剤タイプ】
空腹時の胃の痛みにも
効く!

パンシロン®

胃腸薬

キュアS錠

ストレスや
食べ過ぎによる

- ☑ 胃の痛み
- ☑ 胃の不快感
- ☑ 出すぎた胃酸



第2類医薬品

速効性と持続性の制酸剤配合

O-ト製薬



切り取り線

吸湿しないように、服用のつどチャックをしっかりとしめること **胃腸薬**

【効能・効果】 胃酸過多、胸やけ、胃部不快感、胃部膨満感、もたれ(胃もたれ)、胃痛、胸つかえ、げっぷ(おくび)、はきけ(むかつき)、胃のむかつき、二日酔・悪酔のむかつき、嘔気、悪心)、嘔吐、飲み過ぎ(過飲)、胃痛

⚠ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる)

1. 次の人は服用しないこと (1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人 (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人 (3) 透析療法を受けている人
2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないこと: 胃腸鎮痛鎮痙薬、薬物酔い薬
3. 服用後、薬物又は機械類の運転操作をしないこと (目のかすみ、異常なまぶしさ等の症状があらわれることがある) 4. 長期連用しないこと

相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。
 (1) 医師の治療を受けている人 (2) 授乳中の人 (3) 高齢者 (4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人 (5) 次の症状のある人: 排尿困難 (6) 次の診断を受けた人: 緑内障、腎臓病、甲状腺機能障害
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

関係部位	症状	症状の名称	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ	アナフィラキシー様症状	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ等があらわれる
消化器	吐き気、胃部膨満感	無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる
循環器	動悸		
泌尿器	排尿困難		
その他	目のかすみ		

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。
 その場合は直ちに医師の診療を受けること。

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること: 便秘、下痢、口のかわき
4. 2週間位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

【用法・用量】 次の量を1日3回食前または食間の空腹時に、水又はお湯で服用すること。

15才以上…1回2錠、15才未満…服用しないこと ※食間とは、食後2~3時間を指す。〈用法・用量に関する注意〉

用法・用量を厳守すること。【成分・分量】(6錠中)水酸化マグネシウム 450mg、合成ヒドロタルサイト 780mg、沈降炭酸カルシウム 900mg、ホップ乾燥エキス-Q 33.2mg(ホップとして471.5mg)、アルジオキサ 150mg、ピレンゼピン塩酸塩水和物 46.9mg、添加物として、D-マンニトール、ヒドロキシプロピルセルロース、軽質無水ケイ酸、クロスカルメロースナトリウム、アスパルテーム(L-フェニルアラニン化合物)、結晶セルロース、ステアリン酸マグネシウム、β-メントール、香料を含む。【保管及び取扱上の注意】(1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。(2) 小児の手の届かない所に保管すること。(3) 他の容器に入れ替えないこと。(服用の原因になったり品質が変わる) (4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないこと。

なお、使用期限内であっても、一度開封した後はなるべく早く使用すること。(5) まれに錠剤に黒い点がみられるが品質には問題ない。

使用期限

製造番号

副作用被害救済制度の高合せ先 0120-149-931

ロート製薬株式会社 大阪市生野区巽西1-8-1

お客様安心サポートデスク: 06-6758-1230

