

この説明書は、お薬とともに保管し、服用の際にはよくお読みください。



A-COOP クミアイ

第2類医薬品

胃散「エス」

複合胃腸薬

特 徴

- 制酸効果を主体とした複合胃腸薬です。
- 6種類の生薬がすぐれた健胃効果をあらわします。
- さわやかな服用感があり、散剤なので効果も早くあらわれます。



使用上の注意

してはいけないこと



(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)

1. 次の人は服用しないでください。
透析療法を受けている人
2. 長期連用しないでください。

相談すること



1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
(1)医師の治療を受けている人
(2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
(3)次の診断を受けた人:腎臓病、甲状腺機能障害
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

| 関係部位 | 症 状 |
|------|-----------|
| 皮 膚 | 発疹・発赤、かゆみ |

3. 2週間位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

効能・効果

胃酸過多、食べ過ぎ、飲み過ぎ、胃もたれ、胸やけ、胸つかえ、胃部不快感、胃部・腹部膨満感、食欲不振、消化不良、胃重、胃痛、胃弱、げっぷ、はきけ(胃のむかつき、二日酔・悪酔のむかつき、悪心)、嘔吐

用法・用量

次の量を、添付のさじを使用して、食後に服用してください。（添付のさじはすり切り1杯で1.5gです。）

| 年齢 | 1回量 | 服用回数 |
|--------|---------|------|
| 15歳以上 | 1さじ | 1日3回 |
| 8歳～14歳 | 1/2さじ | |
| 8歳未満 | 服用しないこと | |

〈用法・用量に関連する注意〉

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

成分・分量 1日量(4.5g)中

| 成分 | 含量 |
|-------------|---------|
| 炭酸水素ナトリウム | 2,025mg |
| 沈降炭酸カルシウム | 653mg |
| 炭酸マグネシウム | 504mg |
| ケイ酸マグネシウム | 270mg |
| 合成ケイ酸アルミニウム | 203mg |
| ビオチン | 66mg |
| ケイヒ末 | 351mg |
| ウイキョウ末 | 144mg |
| チョウジ末 | 23mg |
| トウヒ末 | 72mg |
| ニクズク末 | 90mg |
| ニガキ末 | 90mg |
| ℓ-メントール | 9mg |

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり、品質が変わります。）
- (4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

お問い合わせ先

クミアイ家庭薬相談窓口
☎ 0238(46)2013
月～金曜日 9:00～17:00
(祝日を除く)

販売者

全国農業協同組合連合会

東京都千代田区大手町1-3-1

製造販売者

協同薬品工業株式会社

山形県東置賜郡川西町大字西大塚930