

ご使用に際して、この添付文書を必ずお読みください。  
また必要な時に読めるよう大切に保存してください。

第2類医薬品

# 胃のもたれ・不快感に 新和漢胃腸薬KⅡ 【細粒】



使用上の注意



## 相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください  
(1)医師の治療を受けている人。  
(2)次の診断を受けた人。 腎臓病
- 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください 便秘、下痢
- 2週間位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

## 【効能・効果】

胃酸過多、胸やけ、胃部不快感、胃部・腹部膨満感、もたれ(胃もたれ)、胃重、胸つかえ、げっぷ(おくび)、はきけ(むかつき)、胃のむかつき、二日酔・悪酔のむかつき、嘔気、悪心、嘔吐、飲み過ぎ(過飲)、胃痛、食欲不振(食欲減退)、消化不良、胃弱、食べ過ぎ(過食)

## 【用法・用量】

次の量を食前又は食間に水又は白湯にて服用してください。

年齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	1包	3回
11歳以上15歳未満	2/3包	
8歳以上11歳未満	1/2包	
5歳以上8歳未満	1/3包	
5歳未満	服用しないでください	

## 【用法・用量に関連する注意】

- 用法・用量を厳守してください。
- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

## 【成分・分量】

1日量(3包:3.6g)中

成分	分量	成分について
ケイヒ末	600mg	胃の働きを高める生薬成分です。
ウイキョウ末	225mg	
シュクシャ末	210mg	
ショウキョウ末	75mg	
チョウジ末	30mg	
ウコン乾燥エキス	20mg (ウコン312mgに相当)	
ボレイ末	820mg	過剰な胃酸を中和して胸やけなどの不快な症状をやわらげる生薬成分です。
エンゴサク末	450mg	胃の粘膜を修復・保護する生薬成分です。
カンゾウ乾燥エキス	100mg (カンゾウ500mgに相当)	
アカメガシワエキス	125mg (アカメガシワ1000mgに相当)	

添加物として、乳糖水和物、トウモロコシデンプン、ポビドン

## 【保管及び取扱い上の注意】

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- 小児の手のとどかない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- 使用期限の過ぎた製品は使用しないでください。
- 1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。

## 【お問い合わせ先】

本剤のご使用により、何かお気付きの点がございましたら、下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

株式会社廣昌堂

電話番号 076-424-3202

【月～金 9:00～17:00(祝日を除く)】

製造販売元 **株式会社廣昌堂**

富山県射水市水戸田2841

副作用被害救済制度の問い合わせ先  
(独) 医薬品医療機器総合機構  
[http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai\\_camp/index.html](http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html)  
電話 0120-149-931 (フリーダイヤル)