

ご使用に際し、この添付文書は必ずお読みください。
また、必要な時に読めるように大切に保管してください。

2014年4月：記載要領変更に伴う改訂

第2類医薬品

健胃薬・消化薬 胃ダカラ顆粒

食べ過ぎ

消化促進

食欲不振

⚠ 使用上の注意

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 次の人は服用しないこと
透析療法を受けている人。
2. 長期連用しないこと

相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3) 次の診断を受けた人。
腎臓病
2. 2週間位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

[効能・効果]

食欲不振（食欲減退）、胃部・腹部膨満感、消化不良、胃弱、食べ過ぎ（過食）、飲み過ぎ（過飲）、胸やけ、もたれ（胃もたれ）、胸つかえ、はきけ（むかつき、胃のむかつき、二日酔・悪酔のむかつき、嘔気、悪心）、嘔吐、消化促進、消化不良による胃部・腹部膨満感

[用法・用量]

次の1回量を1日3回食後に水又はお湯と一緒に服用すること。

年齢区分	服用量(1回分)
15歳以上	1包
11歳以上15歳未満	2/3包
8歳以上11歳未満	1/2包
5歳以上8歳未満	1/3包
3歳以上5歳未満	1/4包
3歳未満	服用しないこと

(用法・用量に関連する注意)

1. 定められた用法・用量を厳守すること。
2. 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

[成分・分量・はたらき] 1日量 3包(3,000mg)中

成分	分量	はたらき
ウルソデオキシコール酸	45 mg	肝臓に働き、胆汁の分泌を促進し脂肪の消化を助けます。
牛胆汁エキス末	125 mg	胆汁の分泌を促し、脂肪の消化を助けます。
アルジオキサ	90 mg	制酸作用と胃粘膜の修復、保護をします。
センブリ末	40 mg	胃の痛みを和らげ、消化を助け食べ過ぎによく効きます。
オウゴン末	150 mg	
ニンジン末	150 mg	胃の機能を高め、消化不良、腹部膨満感を改善します。
オウレン末	150 mg	
オウバク末	150 mg	弱った胃の働きを盛んにし、胃弱、食欲不振などによく効きます。
ガジュツ末	148 mg	

添加物：乳糖水和物、カルメロースカルシウム

[保管及び取扱い上の注意]

1. 直射日光の当たらない湿気の少ない、涼しい所に保管すること。
2. 小児の手の届かない所に保管すること。
3. 他の容器に入れ替えないこと。
(誤用の原因になったり品質が変わる。)
4. 1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折りかえして保管し、2日以内に服用すること。
5. 使用期限(外箱記載)を過ぎた製品は服用しないこと。

お問い合わせ先

製造販売元 西海製薬株式会社

住所 佐賀県三養基郡基山町大字宮浦192番地

電話番号 0942-92-2303(代)

受付時間 9:00～16:00(土、日、祝日を除く)