

販売名：クラシエ和漢胃腸薬G

3錠×9包 胃腸薬 **第3類医薬品**

〈効能〉  
胃酸過多、胸やけ、胃部不快感、胃部膨満感、もたれ（胃もたれ）、胃重、胸つかえ、げっぷ（おくび）、はきけ（むかつき）、胃のむかつき、二日酔い・悪酔いのむかつき、嘔気、悪心）、嘔吐、飲み過ぎ（過飲）、胃痛、消化促進、消化不良、食欲不振（食欲減退）、食べ過ぎ（過食）、消化不良による胃部・腹部膨満感

発売元 製造販売元  
クラシエ薬品株式会社 剂盛堂薬品株式会社  
東京都港区海岸3-20-20 和歌山市太田二丁目8番31号  
(〒108-8080) (〒640-8323)  
ホームページ www.kracie.co.jp

お客様相談窓口 ☎(03)5446-3334  
受付時間 10:00～17:00(土、日、祝日を除く)

〈成分〉

成人1日の服用量  
9錠(1錠300mg)中  
牛胆汁エキス末…300mg  
オウバク末…150mg  
カンゾウ末…150mg  
ケイヒ末…50mg  
ショウキョウ末…50mg  
ボレイ末…1,000mg  
添加物として、ヒドロキシプロピルセルロース、トウモロコシデンプン、無水ケイ酸、ステアリン酸Mg、デキストリンを含有する。

(成分に関連する注意)  
本剤は天然物(生薬)を用いていますので、錠剤の色が多少異なることがあります。

Kracie

クラシエ和漢胃腸薬G

1

胃酸逆流  
による胸やけ

27錠  
3日分

2

胃のもたれ  
不快感

第3類  
医薬品

〈用法・用量〉  
1日3回食後は食間に水又は白湯にて服用。  
成人(15才以上) ……1回3錠  
15才未満11才以上 ……1回2錠  
11才未満は服用しないこと

(用法・用量に関連する注意)  
小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させていただきます。

副作用被害救済制度の問合せ先  
☎0120-149-931

△ 使用上の注意

■ 相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください  
(1)医師の治療を受けている人 (2)妊婦又は妊娠していると思われる人 (3)高齢者 (4)今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

- 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください 便秘
- 2週間位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
- 他の医薬品等を併用する場合には、含有成分の重複に注意する必要があるため、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

ご使用に際して、外箱の説明文を必ずお読みください。また、必要な時に読めるように大切に保管してください。

〈保管及び取扱い上の注意〉

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。(2)小児の手の届かない所に保管してください。(3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)(4)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。(5)水分が錠剤につきますと、変色または色おらを生じることがありますので、誤って水滴を落としたり、ぬれた手で触れないでください。(6)1包を分割した残りを服用する時は、袋の口を折り返して保管し、2日を過ぎた場合には服用しないでください。

製造  
番号

使用  
期限

押入開ける

20539

O01