

開封口

服用前に、箱の説明書をよくお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

胃腸薬

販売名：活涼®

第3類医薬品

【成分・分量】 1日量9錠(2.7g)中

牛胆汁エキス末 300mg
オウバク末 150mg
カンゾウ末 150mg
ケイヒ末 50mg
ショウキョウ末 50mg
ボレイ末 1000mg

添加物として軽質無水ケイ酸、ステアリン酸マグネシウム、デキストリン、トウモロコシデンプン、ヒドロキシプロピルセルロースを含有します。

本剤は天然の生薬を原料としていますので、多少色調の異なることがあります。効果に変わりはありません。

【用法・用量】 次の量を食後又は食間に、コップ半分以上のぬるま湯にて服用してください。

年齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	3錠	3回
11歳以上15歳未満	2錠	
11歳未満	服用しないでください	

<用法・用量に関連する注意>

- (1)用法・用量を厳守してください。
- (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

【効能・効果】

胃酸過多、胸やけ、胃部不快感、胃部膨満感、または(胃もたれ)、胃重、胸つかえ、げっぷ(おくび)、はきけ(むかつき、胃のむかつき、二日酔・悪酔のむかつき、嘔気、悪心)、嘔吐、飲み過ぎ(過飲)、胃痛、消化促進、消化不良、食欲不振(食欲減退)、食べ過ぎ(過食)、消化不良による胃部・腹部膨満感

▲ 使用上の注意

☎ 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

- (1)医師の治療を受けている人
- (2)妊婦又は妊娠していると思われる人
- (3)今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。
便秘

4. 2週間間服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

5. 他の医薬品等を併用する場合には、含有成分の重複に注意する必要がありますので、医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

生薬

かつりょう
活涼®

奈良大和生薬

第3類医薬品

生薬

晴

シリーズ

第3類医薬品

胃酸過多
胃もたれ
飲んで効く医薬品

31日分 279錠

生薬

かつりょう
活涼®

牛胆汁・黄柏・甘草
桂皮・生姜・牡蛎

奈良大和生薬

【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)
- (4)容器の中の詰め物は、開封後に捨ててください。(詰め物は、錠剤が輸送中に破損するのを防止するためのものです)
- (5)服用の都度、容器のキャップをしっかりと閉めてください。
- (6)錠剤は濡れた手で扱わないでください。
- (7)使用期限の過ぎた製品は服用しないでください。

製造番号

使用期限

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931

お問い合わせ先 株式会社奈良大和生薬
医薬品相談窓口
☎ 0120-005-189
受付時間 9:00~18:00(年中無休)

発売元 株式会社奈良大和生薬
奈良県奈良市二条大路南1-2-11

製造販売元 劑盛堂薬品株式会社
和歌山県和歌山市太田二丁目8番31号



箱



詰め物:PE

