

2015年5月作成

使用に際して、この添付文書を必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

和漢生薬配合  
**胃腸薬 ニューイーロンS** 第2類医薬品  
**布亀 緑の胃腸薬**

【特徴】

- ◇メタケイ酸アルミニウムマグネシウム、炭酸マグネシウム、沈降炭酸カルシウム、炭酸水素ナトリウムが過剰な胃酸を中和して胃粘膜を保護します。
- ◇健胃生薬（ケイヒ末、ゲンチアナ末、ニンジン末）が胃腸の働きを活発にして、消化不良による胃部・腹部膨満感などの症状を改善します。
- ◇ビオヂアスターZ 2000とウルソデオキシコール酸が消化を促進します。
- ◇清涼感があり、細粒状で溶けやすく、飲みやすい胃腸薬です。

**⚠ 使用上の注意**

**☒ してはいけないこと**

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の人は服用しないでください。  
透析療法を受けている人
2. 長期連用しないでください。



**相談すること**

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。
  - (1)医師の治療を受けている人
  - (2)妊娠又は妊娠していると思われる人
  - (3)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
  - (4)次の診断を受けた人  
腎臓病、甲状腺機能障害
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

3. 2週間位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

(裏面もご覧ください)

## 【効能・効果】

胃酸過多、胸やけ、胃部不快感、胃部膨満感、もたれ（胃もたれ）、胃重、胸つかえ、げっぷ（おくび）、はきけ（むかつき、胃のむかつき、二日酔・悪酔のむかつき、嘔気、恶心）、嘔吐、飲み過ぎ（過飲）、胃痛、食欲不振（食欲減退）、腹部膨満感、消化不良、胃弱、食べ過ぎ（過食）、消化促進、消化不良による胃部・腹部膨満感

## 【用法・用量】

次の量を食後又は食間\*に白湯又は水にて服用してください。

年齢	1回服用量	1日服用回数
成人（15歳以上）	1包	3回
11歳以上15歳未満	2/3包	
8歳以上11歳未満	1/2包	
5歳以上8歳未満	1/3包	
5歳未満	服用しないでください。	

\*食間とは、食後  
2～3時間指  
します。

(1)用法・用量を厳守してください。

(2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

## 【成分・分量】 3包中 (1包量 1.2g)

成 分	分 量	成 分	分 量
メタケイ酸アルミン酸マグネシウム	900mg	炭酸マグネシウム	600mg
沈降炭酸カルシウム	600mg	炭酸水素ナトリウム	750mg
ケイヒ末	300mg	ゲンチアナ末	100mg
ニンジン末	60mg	ビオヂアスターゼ 2 0 0 0	60mg
ウルソデオキシコール酸	15mg		

添加物として、カンゾウ抽出物、ショウキヨウ末、チョウジ末、1-メントール、ウイキヨウ末、ニクズク末、銅クロロフィリンナトリウム、メチルセルロース、バレイショデンプン、香料を含有します。

## 【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。  
(誤用の原因になったり品質が変わります)
- (4)1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、  
2日以内に服用してください。
- (5)配置期限を過ぎた製品は服用しないでください。

布亀株式会社 お客様相談室

TEL : (0798) 35-9985

受付時間：午前9:00～午後5:00（土、日、祝日を除く）

発売元 布亀株式会社 兵庫県西宮市今津二葉町3番6号

製造販売元 新新薬品工業株式会社 富山県富山市今市324番地

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

57549 N・15E