

服用の際に、この説明書を必ずお読みください。  
また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

〈総合胃腸薬〉 制酸剤、健胃生薬、消化剤配合 **第2類医薬品**

胃もたれ、胸やけ、胃痛、飲み過ぎ、食べ過ぎに

# イカロンノヴァ<sup>®</sup>

## イカロンノヴァの特徴

- 飲みやすい緑色と茶色の2色の細粒で、食べ過ぎ、飲み過ぎ、はきけ（二日酔、悪酔のむかつき）などの不快な症状に素早く効果を発揮します。
- 胆汁分泌促進成分のウルソデオキシコール酸と消化酵素リパーゼAP6の働きで、時間のかかる脂肪の消化を助けます。
- 消化酵素バイオジアスターゼ2000とプロザイムがでんぷん・たんぱく質の消化を助けます。
- 制酸剤と胃粘膜修復剤の配合により、胃をいためる原因の胃酸の働きをおさえ、弱った胃粘膜の修復を早めます。
- 健胃生薬の配合により、胃の不快な症状を改善します。

## ⚠ 使用上の注意

### ❌ してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります）

1. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください。  
胃腸鎮痛鎮痙薬
2. 授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください。（母乳に移行して乳児の脈が速くなることがあります）



### 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
  - (1) 医師の治療を受けている人。
  - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
  - (3) 高齢者。
  - (4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
  - (5) 次の症状のある人。  
排尿困難
  - (6) 次の診断を受けた人。  
腎臓病、心臓病、緑内障
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

| 関係部位 | 症 状       |
|------|-----------|
| 皮 膚  | 発疹・発赤、かゆみ |

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。  
口のかわき、便秘、下痢
4. 2週間位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

### その他の注意

母乳が出にくくなる場合があります。

※裏面も必ずお読みください。

## 効能・効果

胃酸過多、胸やけ、胃部不快感、胃部・腹部膨満感、もたれ(胃もたれ)、胃重、胸つかえ、げっぷ(おくび)、はきけ(むかつき、胃のむかつき、二日酔・悪酔いのむかつき、嘔気、悪心)、嘔吐、食べ過ぎ(過食)、飲み過ぎ(過飲)、胃痛、食欲不振(食欲減退)、消化不良、胃弱、消化促進

## 用法・用量

次の用量を1日3回食後に服用してください。

| 年 齢        | 1回服用量      | 1日服用回数 |
|------------|------------|--------|
| 大人(15歳以上)  | 1包         | 3回     |
| 11歳以上15歳未満 | 2/3包       |        |
| 8歳以上11歳未満  | 1/2包       |        |
| 5歳以上 8歳未満  | 1/3包       |        |
| 5歳未満       | 服用しないでください |        |



### <用法・用量に関連する注意>

- (1) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (2) 定められた用法・用量を厳守してください。

## 成分・分量

大人1日量3包(1包:1,200mg)中

|                                                                        | 成 分               | 分 量        | は た ら き                            |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|------------------------------------|
| 制酸剤                                                                    | ボレイ末              | 1,000mg    | 出すぎた胃酸を中和し、胃酸過多、胸やけに効果があります。       |
|                                                                        | グリシン              | 400mg      |                                    |
|                                                                        | 酸化マグネシウム          | 250mg      |                                    |
|                                                                        | ロートエキス3倍散(ロートエキス) | 90mg(30mg) |                                    |
| 粘膜修復剤                                                                  | 銅クロロフィリンカリウム      | 50mg       | 胃粘膜のあれやただれの修復を助け、胃炎による吐気、嘔吐をなくします。 |
|                                                                        | アカメガシワ末           | 200mg      |                                    |
| 健胃剤                                                                    | ゲンチアナ末            | 100mg      | 特異な味やかおりをもつ生薬で、おだやかな効き目で胃の調子を整えます。 |
|                                                                        | コウジン末             | 100mg      |                                    |
|                                                                        | ケイヒ末              | 300mg      |                                    |
|                                                                        | チョウジ末             | 50mg       |                                    |
|                                                                        | ショウキョウ末           | 50mg       |                                    |
| 消化剤                                                                    | ビオジアスターゼ2000      | 40mg       | でんぷんやたんぱく質の消化を助けます。(消化酵素)          |
|                                                                        | プロザイム             | 20mg       | たんぱく質の消化を助けます。(消化酵素)               |
|                                                                        | リパーゼAP6           | 120mg      | 脂肪の消化を助けます。(消化酵素)                  |
|                                                                        | ウルソデオキシコール酸       | 60mg       | 肝臓に働き、胆汁の分泌を促進し(利胆作用)、脂肪の消化を助けます。  |
| 添加物として、カルメロース、ヒドロキシプロピルセルロース、結晶セルロース、乳糖水和物、L-メントール、トウモロコシデンプンを含有しています。 |                   |            |                                    |

### <成分に関連する注意>

本剤の服用により便が緑色になることがありますが、配合されている銅クロロフィリンカリウム(緑色)によるものであり心配ありません。

## 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります)
- (4) 1包を分割して残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。
- (5) 表示の使用期限(ケースに記載)を過ぎたものは服用しないでください。

<お問い合わせ先>

中央薬品株式会社 お客様相談窓口

電話番号 076-493-5010

受付時間 9時~17時(土・日・祝日を除く)

製造販売元

スバリ

中央薬品株式会社

富山県富山市西四十物町4-9

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931