

この説明書は本剤とともに保管し、服用に際しては必ずお読みください。
また、必要なときに読めるよう大切に保存してください。

〈複合胃腸薬〉

第2類医薬品

胃もたれ、胸やけ、胃痛、飲み過ぎ、食べすぎに

中京胃腸薬AZ

制酸剤、健胃生薬、消化剤配合

中京胃腸薬AZの特徴

ウルソデオキシコール酸に、3種の消化酵素、5種の健胃生薬を配合したサツと溶けて飲みやすい細粒の胃腸薬です。

食べ過ぎ、飲み過ぎ、はきけ（二日酔、悪酔のむかつき）などの不快な症状を改善します。

- 胆汁分泌促進成分のウルソデオキシコール酸と消化酵素リパーゼAP6の働きで消化に時間がかかる脂肪の分解を助けます。
消化酵素ビオジアスターゼ2000とプロザイムがでんぷん・たんぱく質の消化を助けます。
- 3種類の制酸剤と胃粘膜修復・保護効果のある銅クロロフィリンカリウムとアカメガシワ末の配合により、優れた制酸効果と胃粘膜保護効果をあらわします。
- 5種類の健胃生薬の配合により、胃の不快な症状を改善します。
- 緑色と茶色の2色の細粒で、水に溶けやすく素早く効果を発揮します。

⚠ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります）

1. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください。
胃腸鎮痛鎮痙薬
2. 授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください。（母乳に移行して乳児の脈が速くなることがあります）



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3) 高齢者。
(4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(5) 次の症状のある人。
排尿困難
(6) 次の診断を受けた人。
腎臓病、心臓病、緑内障
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
口のかわき、便秘、下痢
4. 2週間位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

その他の注意

母乳が出にくくなる場合があります。

効能・効果

胃酸過多、胸やけ、胃部不快感、胃部・腹部膨満感、もたれ(胃もたれ)、胃重、胸つかえ、げっぷ(おくび)、はきけ(むかつき、胃のむかつき、二日酔・悪酔いのむかつき、嘔気、悪心)、嘔吐、食べ過ぎ(過食)、飲み過ぎ(過飲)、胃痛、食欲不振(食欲減退)、消化不良、胃弱、消化促進

用法・用量

次の用量を、1日3回食後に服用してください。

年齢	1回服用量	1日服用回数
大人(15歳以上)	1包	3回
11歳以上15歳未満	2/3包	
8歳以上11歳未満	1/2包	
5歳以上 8歳未満	1/3包	
5歳未満	服用しないでください	



<用法・用量に関する注意事項>

- (1) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (2) 定められた用法・用量を厳守してください。

成分・分量

中京胃腸薬AZは、大人1日量3包(1包:1,200mg)中に次の成分を含んでいます。

	成分	分量	はたらき
制酸剤	ボレイ末	1,000mg	出すぎた胃酸を中和し、胃酸過多、胸やけに効果があります。
	グリシン	400mg	
	酸化マグネシウム	250mg	
鎮痛 鎮痙剤	ロートエキス3倍散 (ロートエキス)	90mg (30mg)	胃酸の分泌、胃腸の過剰な運動を抑え、痛みを緩和します。
	粘膜 修復剤	銅クロロフィリンカリウム	50mg
アカメガシワ末		200mg	
健胃剤	ゲンチアナ末	100mg	特異な味やかおりをもつ生薬で、おだやかな効き目で胃の調子を整えます。
	コウジン末	100mg	
	ケイヒ末	300mg	
	チョウジ末	50mg	
	ショウキョウ末	50mg	
消化剤	ビオジアスターゼ2000	40mg	でんぷんやたんぱく質の消化を助けます。(消化酵素)
	プロザイム	20mg	たんぱく質の消化を助けます。(消化酵素)
	リパーゼAP6	120mg	脂肪の消化を助けます。(消化酵素)
	ウルソデオキシコール酸	60mg	肝臓に働き、胆汁の分泌を促進し(利胆作用)、脂肪の消化を助けます。

添加物として、カルメロース、ヒドロキシプロピルセルロース、結晶セルロース、乳糖水和物、l-メントール、トウモロコシデンプンを含有しています。

<成分に関連する注意>

本剤の服用により便が緑色になることがありますが、配合されている銅クロロフィリンカリウム(緑色)によるものであり心配ありません。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変化します)
- (4) 1包を分割して残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。
- (5) 表示の期限(ケースに記載)を過ぎたものは服用しないでください。

<お問い合わせ先> 本剤についてのお問い合わせは下記までご連絡ください。

中央薬品株式会社 お客様相談窓口

電話番号 076-493-5010 受付時間 9:00~17:00(土・日・祝日を除く)