

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保存してください。

飲みすぎ・食べすぎ・胃のもたれ

ニチイ胃腸薬

ニチイ胃腸薬は、中国の漢方胃腸薬に基づいてつくられた顆粒剤の飲み易い和漢胃腸薬です。飲みすぎ、食べすぎ、胃のもたれはもとより、胃痛、胸やけ、胃酸過多などに優れた効果があります。

- 【特長】** ◇苦味性、芳香性、辛味性などの生薬が胃の働きを活発にし、消化不良、食欲不振、胃のむかつきを改善し食欲を増進します。
- ◇制酸剤のはたらきで胸やけ、胃のもたれ、胃酸過多を改善します。
- ◇鎮痛鎮けい生薬のはたらきにより胃痛を改善します。



相談すること

⚠ 使用上の注意

- 1) 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること。
 - (1) 医師の治療を受けている人。
- 2) 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること。
 - (1) 1ヶ月位服用しても症状がよくなる場合。

【効能】

胃酸過多、胸やけ、胃部不快感、胃もたれ、胃重、胸つかえ、げっぷ、はきけ(むかつき、二日酔・悪酔のむかつき、悪心)、嘔吐、飲みすぎ、胃痛、食欲不振、胃部・腹部膨満感、消化不良、胃弱、食べ過ぎ。

【用法・用量】

15才以上…………… 1回1包 5才以上8才未満… 1回 $\frac{1}{3}$ 包
11才以上15才未満… 1回 $\frac{2}{3}$ 包 3才以上5才未満… 1回 $\frac{1}{4}$ 包
8才以上11才未満… 1回 $\frac{1}{2}$ 包
1日3回食後に服用して下さい。

<用法用量に関する注意>

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。
本剤は、3才未満の乳幼児に服用させないでください。

裏面につづく

[成分・分量及び各生薬のはたらき] 1日量3包(3.3g)中

	成分	分量	作用
苦味健胃薬	当 ^{セン} 薬 ^{フリ} 末	30mg	消化液の分泌を促進し、食べすぎ、飲みすぎ、胃もたれ、食欲不振、消化不良を改善します。
	ゲン ^ウ チ ^{バク} ア ^{キョウ} ナ末	150mg	
	黄 ^{ウイ} 柏 ^{キョウ} 末	300mg	
芳香性健胃薬	桂 ^{テイ} 皮 ^ヒ 末	450mg	唾液と胃液の分泌を促し消化を助けます。胃腸の働きを活発にし、胃部・腹部膨満、胃のむかつきを改善し、鎮痛作用により胃痛を鎮めます。
	茴 ^{ウイ} 香 ^{キョウ} 末	450mg	
辛味性健胃薬	生 ^{ショウ} 姜 ^{キョウ} 末	150mg	血行をよくし、胃腸の働きが活発になり胃腸機能を調整し、嘔吐を鎮めます。
鎮痛鎮けい薬	延 ^{エン} 胡 ^ゴ 索 ^{サク} 末	450mg	鎮痛作用が強く、胃痛を鎮めます。各成分の作用を調和して薬効を強めます。
	甘 ^{カン} 草 ^{ソウ} 末	300mg	
制酸薬	牡 ^ボ 蛎 ^{レイ} 末	900mg	制酸作用により過剰の胃酸を中和し、胃粘膜を保護し、胃酸過多、胸やけ、げっぷを改善します。

添加物：L-メントール、デヒドロ酢酸Na、ヒドロキシプロピルセルロース、トウモロコシデンプン

本剤は、生薬製剤ですから、製品により顆粒の色が多少異なることがあります。効果には変わりありません。

保管及び取扱上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 誤用をさけ、品質を保持するため、他の容器に入れ替えないこと。
- (4) 1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用すること。

製造販売元



日本医薬品製造株式会社

奈良県御所市古瀬18番地
お問い合わせ先 TEL 0745 (67) 0015

