

健胃消化薬

笹岡U胃腸薬

ウルソデオキシコール酸60mg+ 薬用ニンジン配合

本剤は、飲み過ぎたり食べ過ぎたりして、胃の不調を感じたときや、食欲がないときなどに服用すると胃腸の不調を改善してくれる、ウルソデオキシコール酸配合の胃腸薬です。

本剤は、食事の前に服用しますと胃の動きが良くなり食欲不振を改善し、お酒を飲む前の服用で、飲み過ぎによるむかつきにも効果があります。

又、食後の服用では胃の排出機能が高まり、脂肪の消化が助けられ、もたれや胸やけに効果があります。

二日酔い・悪酔いのむかつきにも服用ください。

⚠ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)

1. 次の人は服用しないでください。
○透析療法を受けている人
2. 長期連用しないでください。



■ 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。
(1) 医師の治療を受けている人
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
(3) 次の診断を受けた人 ○腎臓病
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。



関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

3. 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。
○便秘、下痢
4. 2週間位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

【効能・効果】

食欲不振(食欲減退)、胃部・腹部膨満感、消化不良、胃弱、食べ過ぎ(過食)、飲み過ぎ(過飲)、胸やけ、もたれ(胃もたれ)、胸つかえ、はきけ(むかつき、胃のむかつき、二日酔い・悪酔いのむかつき、嘔気、悪心)、嘔吐、消化促進、消化不良による胃部・腹部膨満感

用法・用量、成分・分量、保管及び取扱い上の注意、お問い合わせ先については、裏面をご覧ください。

【用法・用量】

次の量を食前又は食後に、水又はぬるま湯で服用してください。

年齢	1回服用量	1日服用回数
成人(15歳以上)	3錠	3回
11歳以上15歳未満	2錠	
8歳以上11歳未満	1・1/2錠	
5歳以上8歳未満	1錠	
5歳未満	服用しないこと	

○服用の直前に1錠ずつ押し出して服用してください。

○本剤の取り出し方

図のように、本剤の入っているPTPシートの凸部を指先で押し、裏面のアルミ箔を破り取り出してください。(切り離れたPTPシートごと誤って飲み込みますと、食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながりますのでご注意ください。)



〈用法・用量に関連する注意〉

1. 定められた用法、用量をお守りください。
2. 5歳以上15歳未満の小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
3. 本剤がのどにつかえることのないよう、よく注意してください。
4. 1錠を分割した残りを服用する場合は、清潔な紙に包んで外箱の中に保管し、2日以内に服用してください。

【成分・分量】 1日量(9錠)中


成分	分量
ニンジン末(健胃生薬)	120mg
ケイヒ末(健胃生薬)	300mg
ショウキョウ末(健胃生薬)	90mg
ゲンチアナ末(健胃生薬)	60mg
ウルソデオキシコール酸(利胆剤)	60mg

添加物として、グリチルリチン酸2K、オウバク末、l-メントール、合成ヒドロタルサイト、トウモロコシデンプン、乳糖水和物、ヒドロキシプロピルセルロース、ステアリン酸Mg、タルクを含有する。

※生薬配合のため、製造ロットにより錠剤の色が異なることがあります。

【保管及び取扱い上の注意】

1. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
2. 小児の手の届かない所に保管してください。
3. 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり、品質が変わることがあります。)
4. PTPシートを切り離すときは、変質の原因となりますので、服用しない本剤の裏面のアルミ箔に傷をつけないようにしてください。又、切り離れたPTPシートの方で、手指などを傷つけないようご注意ください。
5. 使用期限の過ぎた製品は服用しないでください。
6. 外箱の「開封年月日」記入欄に、開封した日付を記入してください。
7. 一度開封した後は、品質保持の点からなるべく早く服用してください。
8. この説明書には、本剤を服用するときに必要な注意事項などが記載されていますので、服用が終わるまで本剤とともに外箱に入れて保管してください。



説明書はいつでも
読めるように外箱に保管



お問い合わせ先

ジャパンメディック株式会社 お客様相談窓口 ☎076-438-1107
受付時間：月～金（祝祭日・年末年始を除く）9:00～17:00

副作用被害救済制度の問合せ先
(独)医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
電話 0120-149-931 (フリーダイヤル)