

和漢胃腸藥



能 胃弱、食べすぎ、食欲不振、飲みすぎ、消化不良、もたれ
効 胸やけ、胸つかえ、はきけ、嘔吐、胃部・腹部膨満感

黄柏・当薬工キス配合

薬王丸

発売元 株式会社 一貫堂

福島県いわき市郷ヶ丘四丁目十八番四



第2類医薬品

販売名: 薬王丸 第2類医薬品

使用に際して、この添付文書を必ずお読みください。
また、必要ときに読めるよう大切に保管してください。

▲ 使用上の注意

☒ してはいけないこと

- (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)
1 次の人には服用しないこと 透視療法を受けている人。
2 長期連用しないこと

☒ 相談すること

1 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること (1) 医師の治療を受けている人。 (2) 次の診断を受けた人。 腎臓病 2. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること 便秘、下痢 3. 2週間以上服用しても症状がよくなるらない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

効能又は効果

食欲不振(食欲減退)、胃部・腹部膨満感、消化不良、胃痛、食べ過ぎ(過食)、飲み過ぎ(過飲)、胸やけ、もたれ(胃もたれ)、胸つかえ、はきけ(むかつき、胃のむかつき)、二日酔・悪酔のむかつき、嘔気、悪心)、嘔吐、整腸(便秘を整える)、軟便、便秘

用法及び用量

次の量を、食後に服用してください。

年齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	30丸	3 回
11歳以上15歳未満	20丸	
8歳以上11歳未満	15丸	
5歳以上8歳未満	10丸	
5歳未満	服用しないこと	

＜用法及び用塵に關する注意＞

- (1) 定められた用法及び用量を厳守すること。
(2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

成分及び分量 1日量(30丸)中

オウバク末	1,800mg
ゲンノショウコ末	1,500mg
ケイヒ末	300mg
水酸化アルミナマグネシウム	230mg
センブリエキス	90mg
(原生薬換算450mg)	
リン酸水素カルシウム	230mg
添加物として寒梅粉、タルク、ヒドロキシプロピルセルロース、デヒドロ酢酸Na、三乙酸鉄、赤色102号を含有します。	

保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。また、1包を分割した残りは、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用すること。
 - 小児の手の届かない所に保管すること。
 - 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる)
 - 配置期限を過ぎた製品は使用しないこと。
- 6包(1包30丸×6)入 定価700円+税

製造販売元 **薬王製薬株式会社**

奈良県磯城郡田原本町245番地
この商品のお問い合わせは
電話 0744-33-8856

副作用被害救済制度
電話 0120-149-931

配置期限 製造番号

