

医薬品

300錠

胃腸薬
胃痛・胃酸過多

イキシシ
InokisinA



製造販売元

和田製薬株式会社

奈良県御所市池の内340

TEL 0745 (62) 5624

胃酸過多

効能又は効果

胃酸過多、胸やけ、胃部不快感、胃部膨満感、もたれ（胃もたれ）、胃重、胸つかえ、げっぷ（おくび）、はきけ（むかつき）、胃のむかつき、二日酔・悪酔のむかつき、嘔気、悪心）、嘔吐、飲みすぎ（過飲）、胃痛、消化不良、食欲不振、食べ過ぎ（過食）、消化不良による胃部・腹部膨満感、消化促進

用法及び用量

大人（15才以上）1回……………4錠
11才以上15才未満1回……………3錠
8才以上11才未満1回……………2錠
5才以上 8才未満1回……………1錠
1日3回食後服用する。

第2類医薬品

300錠入 本体価格 ￥



医薬品

300錠

胃腸薬
胃痛・胃酸過多

イキシシA
InokisinA



製造販売元

和田製薬株式会社

奈良県御所市池の内340

TEL 0745 (62) 5624



成分及び分量 1日量(12錠中)

メタケイ酸アルミン酸マグネシウム… 1200mg
ビオチンアスターゼ……………200mg
リコチミンN-P…………… 380mg
日局ロートエキス散……………210mg
添加物として、バレイシヨデンプン、結晶セル
ロース、*l*-メントール、タルクを含む

注 意

- 1.小児の手のとどかない所に保管して下さい。
- 2.服用に際しては、添付文書をよく読んで下さい。
- 3.直射日光をさけ、湿気の少ない涼しい場所に保管して下さい。
- 4.配置期限の切れた製品は、服用しないで下さい。



紙:箱 ラ:外装フィルム

配置期限

胃痛、二日酔のむかつきに

イノキシナ

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

1. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないで下さい。
胃腸鎮痛鎮痙薬
2. 授乳中の人には本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けて下さい。
3. 長期連用しないで下さい。

🏠 相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談して下さい。
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3) 高齢者。
 - (4) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
 - (5) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (6) 次の症状のある人。
むくみ、排尿困難
 - (7) 次の診断を受けた人。
腎臓病、高血圧、心臓病、緑内障

この説明書は、服用前に必ずお読みください
また必要なときに読めるように保存してください

第2類医薬品

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談して下さい。
(1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けて下さい。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症	尿量が減少する、顔や手足がむくむ、まぶたが重くなる、手がこわばる、血圧が高くなる、頭痛等があらわれる。

(2) 5～6日間服用しても症状がよくなる場合

3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談して下さい。
口のかわき、便秘、下痢

⚠ その他の注意

1. 母乳が出にくくなる場合があります。
2. 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させて下さい。
3. 5歳以上の幼児に服用させる場合には、薬剤がのどにつかえることのないよう、よく注意して下さい。

⚠ 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管して下さい。
- (2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3) 他の容器に入れ替えないで下さい。
- (4) 配置期限の切れた製品は服用しないで下さい。