

内外胃腸薬S錠

特徴

内外胃腸薬S錠は食前又は食後に服用していただける、ウルソデオキシコール酸・ウコン末・コウジン末配合の胃腸薬です。

食前に服用すると...

胃もたれ・むかつき等といった不快症状を緩和し弱った胃の調子を整えてくれます。

食後に服用すると...

消化に時間のかかる脂肪の消化を助け、胸やけや胃もたれ、腹部のはり等を緩和します。また、食べ過ぎ飲み過ぎ等にも効果的です。



使用上の注意



相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - 医師の治療を受けている人。
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - 次の診断を受けた人。
フェニルケトン尿症
- 2週間位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

■ 効能又は効果

食欲不振（食欲減退）、胃部・腹部膨満感、消化不良、胃弱、食べ過ぎ（過食）、飲み過ぎ（過飲）、胸やけ、もたれ（胃もたれ）、胸つかえ、はきけ（むかつき、胃のむかつき、二日酔・悪酔のむかつき、嘔気、悪心）、嘔吐、消化促進、消化不良による胃部・腹部膨満感

■ 用法及び用量

次の1回量を1日3回食前又は食後に服用してください。

年齢	1回量	1日服用回数
大人（15歳以上）	3錠	3回
11歳以上15歳未満	2錠	
8歳以上11歳未満	1・1/2錠	
5歳以上8歳未満	1錠	
5歳未満	服用しないこと	

〈用法及び用量に関連する注意〉

- (1) 本剤は、定められた用法及び用量を厳守してください。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (3) 1錠を分割した残りを使用する場合には、清潔な紙につつま外箱の中に保管し、2日以内に使用してください。
- (4) 錠剤の取り出し方。

右図のように錠剤の入っているPTPシートの凸部を指先で強く押して、裏面のアルミ箔を破り、取り出してお飲みください（誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながります。）。

(PTPシートの取り出し図)



■ 成分及び分量 1日量（9錠）中

ケイヒ末	300 mg	コウジン末	120 mg
ウイキョウ末	100 mg	ウコン末	100 mg
ショウキョウ末	100 mg	オウバク末	60 mg
ウルソデオキシコール酸	60 mg	カンゾウ末	300 mg

添加物としてセルロース、無水ケイ酸、アスパルテム（L-フェニルアラニン化合物）、l-メントール、ステアリン酸Mg、その他3成分を含有する。

〈成分に関連する注意〉

生薬（薬用の草根木皮等）を用いた製剤ですから、製品により錠剤の色調が多少異なることがあります。効果には変わりありません。

■ 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください（誤用の原因になったり品質が変わります。）。
- (4) 表示の期限を過ぎた製品は服用しないでください。

