

成 分	含 量	はたらき
ビオヂアスター ^ゼ 2000	25mg	炭水化物を消化する酵素です。
プロザイム	30mg	タンパク質を消化する酵素です。
ケイヒ末	300mg	食欲を増進する芳香健胃生薬です。
ゲンチアナ末	150mg	胃のむかつき、食欲不振を改善する苦味健胃薬です。

添加剤：乳糖水和物、CMC-Ca、ヒドロキシプロピルセルロース、I-メントール、プロピレン glycole、香料 含有

〈成分・分量に関する注意〉

服用後、便が緑色になる場合がありますが、銅クロロフィリンナトリウム（緑色）が排泄されるためなので心配いりません。

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わるおそれがあります。)
- (4)1包を分割した残りを使用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に使用してください。
- (5)配置期限を過ぎた製品は服用しないでください。

お問い合わせ先 株式会社 富士薬品（学術室）
電話 (048) 648-1118 9:00~17:30 (土、日、祝日を除く)

製造販売元
 株式会社富士薬品
埼玉県さいたま市大宮区桜木町4丁目383番地

08BI00

2012年9月（記載要領変更に伴う改訂）

服用に際して、必ずこの説明文書をお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

第2類医薬品

総合胃腸薬

食べすぎ・飲みすぎ・胃の痛みに 新クリエフ胃腸薬[®]

〈細粒〉

◆新クリエフ胃腸薬は、食べすぎ・飲みすぎ・胃の痛み・胃もたれ・胸やけなど、食間または食後の諸症状に、制酸剤、消化酵素、健胃生薬に加え、粘膜修復剤および鎮痙剤を配合し、優れた効果を発揮します。



使用上の注意



してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。）

1. 次の人は服用しないでください。
透析療法を受けている人
2. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください。
胃腸鎮痛鎮痙薬
3. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください。
(母乳に移行して乳児の脈が速くなることがあります。)
4. 長期連用しないでください。



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

裏面もお読みください。

- (1)医師の治療を受けている人
- (2)妊娠又は妊娠していると思われる人
- (3)高齢者
- (4)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
- (5)次の症状のある人
排尿困難
- (6)次の診断を受けた人
腎臓病、心臓病、緑内障

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
口のかわき、便秘、下痢

4. 2週間位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

【その他の注意】

母乳が出にくくなることがあります。

効能・効果

胃酸過多、胸やけ、胃部不快感、胃部・腹部膨満感、もたれ(胃もたれ)、胃重、胸つかえ、げっぷ(おくび)、はきけ(むかつき、胃のむかつき、二日酔・悪酔のむかつき、嘔気、恶心)、嘔吐、食べ過ぎ(過食)、飲み過ぎ(過飲)、胃痛、食欲不振(食欲減退)、消化不良、胃弱、消化促進

用法・用量

次の1回量を1日3回、食後または食間に、水またはお湯で服用してください。

年 齡	1 回 量	1 日 服 用 回 数
15才以上(成人)	1包	3回
11才以上15才未満	2/3包	
8才以上11才未満	1/2包	
8才未満	服用しないこと	

※食間とは、食後2~3時間を目指し、胃の中の食べ物がほぼなくなっている時です。
〈用法・用量に関する注意〉

(1)定められた用法・用量を厳守してください。

(2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

成 分・分 量

1日量 3包 (1包1,400mg) 中

成 分	含 量	はたらき
ケイ酸アルミン酸マグネシウム(ノイシリンA)	1,200mg	持続的に胃酸を中和し、胃粘膜を保護します。
炭酸マグネシウム	300mg	即効的に胃酸を中和し、胃酸過多、胸やけを改善します。
炭酸水素ナトリウム	750mg	
ロートエキス3倍散	90mg	胃の痛みを鎮め、過剰な胃酸の分泌を抑えます。
アルジオキサ	200mg	荒れた胃粘膜を保護、修復します。
銅クロロフィリンナトリウム	48mg	荒れた胃粘膜を修復します。
カンゾウ末	300mg	胃粘膜の荒れを抑えます。
ウルソデオキシコール酸	30mg	脂肪の消化吸収を助けます。
リパーゼ	120mg	脂肪を消化する酵素です。