

ご使用に際し、この添付文書は必ずお読みください。  
また、必要な時にお読みになれるよう大切に保管してください。

2012年6月：記載要領変更に伴う改訂

生薬配合 第2類医薬品

# タキマック

食べ過ぎ・飲み過ぎ・食欲不振・はきけ(二日酔)などに



7種類の生薬入 【顆粒】

## ⚠ 使用上の注意

### してはいけないこと ☒

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 次の人は服用しないこと  
透析療法を受けている人。
2. 長期連用しないこと

### 相談すること ☑

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
  - (1) 医師の治療を受けている人。
  - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
  - (3) 次の診断を受けた人。

腎臓病

2. 2週間位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

## [効能・効果]

食欲不振(食欲減退)、胃部・腹部膨満感、消化不良、胃弱、食べ過ぎ(過食)、飲み過ぎ(過飲)、胸やけ、もたれ(胃もたれ)、胸つかえ、はきけ(むかつき、胃のむかつき、二日酔・悪酔のむかつき、嘔気、悪心)、嘔吐、消化促進、消化不良による胃部・腹部膨満感

[用法・用量]

年齢区分	服用量（1回分）
15歳以上	1包
11歳以上15歳未満	2/3包
8歳以上11歳未満	1/2包
5歳以上8歳未満	1/3包
3歳以上5歳未満	1/4包
3歳未満	服用しないこと

1. いずれも1日3回食後に服用する。
2. 水又はお湯と一緒に服用してください。

(用法・用量に関連する注意)

1. 定められた用法、用量を厳守すること。
2. 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

[成分・分量] 1日量 3包(3,000mg)中に次の成分を含んでいます。

成分名	含有量	成分名	含有量
ウルソデオキシコール酸	45 mg	ニンジン末	150 mg
牛胆汁エキス末	125 mg	オウレン末	150 mg
アルジオキサ	90 mg	オウバク末	150 mg
センブリ末	40 mg	ガジュツ末	148 mg
オウゴン末	150 mg		

添加物として乳糖水和物、カルメロースカルシウムを含有する。

[保管及び取り扱い上の注意]

1. 直接日光の当たらない湿気の少ない、涼しい所に保管すること。
2. 小児の手の届かない所に保管すること。
3. 誤用をさげ、品質を保持するため、他の容器に入れ替えないこと。
4. 1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折りかえして保管し、2日以内に服用すること。
5. 使用期限（外箱記載）を過ぎた製品は使用しないでください。

製造販売元



自然のちから、ひとに活かして

株式会社 **タキザワ漢方** 廠

さいたま市見沼区片柳412-1

消費者相談室 ☎048-688-7923

受付時間 AM9:00～PM6:00（土・日・祝日を除く）

タキザワ漢方



ホームページ: takizawa.asia