

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

第2類医薬品

胃粘膜修復剤 MMSC 100mg・アカメガシワ配合

# 新佐藤胃腸薬

新佐藤胃腸薬Lは、ストレスの多い生活環境や、肉や脂肪類の多い食生活からくる胃腸の負担を改善するために、次のような特長もっています。

- メチルメチオニンスルホニウムクロライド（MMS C）は、胃の粘膜に直接働き、荒れた胃を保護します。
- 胃もたれの原因である脂肪の消化を促進させるために、脂肪消化酵素のリパーゼA P6を配合しています。ビオチアスターゼ2000と相まって、胃腸の負担を軽くし、すっきりとした食後感が期待できます。
- ナトリウム・フリータイプですから、減塩を心掛けている方にも適します。



## 使用上の注意



### してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります）

1. 次の人は服用しないでください  
透析療法を受けている人。
2. 長期連用しないでください



### 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください  
(1)医師の治療を受けている人。  
(2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。  
(3)次の診断を受けた人。  
腎臓病
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

| 関係部位 | 症 状       |
|------|-----------|
| 皮 膚  | 発疹・発赤、かゆみ |

3. 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください  
下痢
4. 2週間位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

## 効能・効果

胃酸過多、胸やけ、胃部不快感、胃もたれ、胃重、胸つかえ、げっぷ、はきけ（胃のむかつき、二日酔・悪酔のむかつき）、嘔吐、飲みすぎ、食べすぎ、胃痛、食欲不振、胃部・腹部膨満感、消化不良、胃弱、消化促進

裏面もお読みください

## 用法・用量

次の量を食後に水又はぬるま湯で服用してください。

| 年 齢         | 1 回量       | 1 日服用回数 |
|-------------|------------|---------|
| 大人（15歳以上）   | 1 包        | 3 回     |
| 11歳以上15歳未満  | 2/3包       |         |
| 8 歳以上11歳未満  | 1/2包       |         |
| 5 歳以上 8 歳未満 | 1/3包       |         |
| 5 歳未満       | 服用しないでください |         |

### <用法・用量に関連する注意>

- (1)用法・用量を厳守してください。
- (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

## 成分・分量

3 包中

| 成 分                         | 含 量    | は た ら き                             |
|-----------------------------|--------|-------------------------------------|
| メチルメチオニンスルホニウムクロライド (MMS C) | 100mg  | 荒れた胃粘膜を修復するとともに保護します。               |
| 合成ヒドロタルサイト                  | 2000mg | 過剰の胃酸を中和して、不快な過酸症状を改善します。           |
| ビオザスターゼ2000                 | 100mg  | 炭水化物、蛋白質、脂肪の消化を助けます。                |
| リパーゼ A P 6                  | 60mg   | 脂肪の消化を助けます。                         |
| アカメガシワ（赤芽柏）                 | 200mg  | 荒れた胃の粘膜に作用し、保護します。                  |
| ケイヒ末（桂皮末）                   | 300mg  | 低下した胃腸の働きを活発にし、消化液の分泌を促して消化機能を整えます。 |
| ソヨウ（蘇葉）                     | 100mg  |                                     |
| ショウキョウ末（生姜末）                | 100mg  |                                     |

添加物：ヒドロキシプロピルセルロース、乳糖、トウモロコシデンプン、硬化油、ショ糖脂肪酸エステル、セルロース、ステアリン酸Ca、1-メントール

## 保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください（誤用の原因になったり品質が変わります）。
- (4)1 包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2 日以内に服用してください。
- (5)配置期限を過ぎた製品は服用しないでください。

## お問い合わせ先

- (1)本製品の購入先
- (2)佐藤薬品工業株式会社 医薬情報室  
TEL 0744-28-0021 受付時間 9：00～16：30（土・日・祝日を除く）

製造販売元



佐藤薬品工業株式会社

奈良県橿原市観音寺町 9 番地の 2