

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

第2類医薬品

制酸健胃消化薬

クミアイ 胃腸錠

本品は、胸やけ等にみられる胃酸過多のときに、胃の中の過剰の酸を中和してすっきりさせたり、食べ過ぎや胃腸の消化力が衰えているときに、食物の消化を助けて胃腸の負担を軽くしたり、そのほか胃腸の機能を高める制酸健胃消化薬です。



使用上の注意



してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります）

1. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください
胃腸鎮痛鎮痙薬
2. 授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください
（母乳に移行して乳児の脈が速くなることがあります。）



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1)医師の治療を受けている人。
(2)妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3)高齢者。
(4)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(5)次の症状のある人。
排尿困難
(6)次の診断を受けた人。
腎臓病、心臓病、緑内障
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

| 関係部位 | 症 状 |
|------|-----------|
| 皮 膚 | 発疹・発赤、かゆみ |

3. 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
口のかわき、便秘、下痢
4. 2週間位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

その他の注意

母乳が出にくくなることがあります。

効能・効果

胃酸過多、胸やけ、胸つかえ、げっぷ、胃部不快感、はきけ、嘔吐、胃重、胃弱、飲み過ぎ、消化促進、もたれ、食べ過ぎ、食欲不振、消化不良、胃部・腹部膨満感、胃痛

用法・用量

次の量を食後なるべく30分以内に服用してください。

| 年 齢 | 1 回量 | 1 日服用回数 |
|-------------|------------|---------|
| 大人（15歳以上） | 4 錠 | 3 回 |
| 8 歳以上15歳未満 | 2 錠 | |
| 5 歳以上 8 歳未満 | 1 錠 | |
| 5 歳未満 | 服用しないでください | |

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)用法・用量を厳守してください。
- (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

成分・分量

12錠（大人の1日量）中

| 成 分 | 含 量 | はたらき |
|---------------|--------|----------------------|
| 炭酸水素ナトリウム | 1500mg | 過剰な胃酸を中和します。 |
| 重質炭酸マグネシウム | 260mg | |
| ロートエキス | 30mg | 胃酸の分泌を抑え、胃の痛みを和らげます。 |
| ビオチンアスターゼ1000 | 60mg | 消化を助けます。 |
| センブリ末 | 10mg | 胃腸のはたらきを改善します。 |
| オウバク乾燥エキス | 250mg | |

添加物：L-メントール、CMC-Na、ステアリン酸Ca、乳糖

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください（誤用の原因になったり品質が変わります。）。
- (4)期限を過ぎた製品は服用しないでください。

お問い合わせ先

- (1)本製品の購入先（北海道厚生農業協同組合連合会）
- (2)佐藤薬品工業株式会社 医薬情報室
TEL 0744-28-0021
受付時間 9：00～16：30（土・日・祝日を除く）