

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

第2類医薬品

胃腸薬

ビオチアスターA[®] 顆粒

製品の特徴

- 荒れた胃粘膜の炎症を抑え、修復して、保護します。アズレンスルホン酸ナトリウム水和物、アルジオキサ、カンゾウ粗エキスの3種類の粘膜修復剤が効果的にはたらいで、胃粘膜を守ります。
- 胃酸を効果的に中和します。合成ヒドロタルサイト、ケイ酸アルミン酸マグネシウム²の2種類の制酸剤が胃の痛みの症状のもととなる過剰な胃酸を中和します。さらにロートエキスが胃の痛みを鎮め、胃酸の分泌を抑えます。
- 胃のもたれ、食欲不振にすぐれた効果を発揮します。ビオチアスターゼ2000、リパーゼAP6の2種類の消化酵素が食べ物のでんぷん、たん白質、脂肪を胃の中で消化(分解)し、弱った胃の負担を減らします。
- 胃の症状に合わせて食間(空腹時)あるいは食後に服用できます。空腹時の胃の痛み・不快感の症状がある方は、食間の服用をお薦めします。食後の胃のもたれ、食べすぎの方は、食後の服用をお薦めします。



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の人は服用しないでください
透析療法を受けている人。
2. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください
胃腸鎮痛鎮痙薬
3. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください
(母乳に移行して乳児の脈が速くなることがあります。)
4. 長期連用しないでください



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3) 高齢者。
(4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(5) 次の症状のある人。
排尿困難
- (6) 次の診断を受けた人。
腎臓病、心臓病、緑内障
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

3. 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
口のかわき、便秘、下痢
4. 2週間位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

その他の注意

母乳が出にくくなる場合があります。

効能・効果

胃痛、胃部不快感、胸やけ、飲みすぎ(過飲)、はきけ(二日酔・悪酔のむかつき)、胃のむかつき、むかつき、嘔気、悪心)、嘔吐、胃酸過多、胃部・腹部膨満感、もたれ(胃もたれ)、食欲不振(食欲減退)、胸つかえ、胃重、げっぷ(おくび)、胃弱、消化不良、食べすぎ(過食)、消化促進、消化不良による胃部・腹部膨満感

用法・用量

次の量を食間又は食後に服用してください。

年齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	1包	3回
11～14歳	2/3包	
8～10歳	1/2包	
5～7歳	1/3包	
乳幼児(5歳未満)	服用しないこと	

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

成分・分量

3包(成人の1日服用量)中

成分	含量	はたらき
アズレンスルホン酸 ナトリウム水和物	6mg	荒れた胃粘膜を修復します。
アルジオキサ	300mg	胃粘膜を保護します。
カンゾウ粗エキス	150mg	胃の粘膜を修復・保護し、胃の痛みを鎮めます。
合成ヒドロタルサイト	1300mg	胃酸を中和し、胃のpHを適した状態に保ちます。
ケイ酸アルミン酸マグネシウム	700mg	
ロートエキス3倍散	90mg	胃酸の分泌を抑え、胃の痛みを鎮めます。
ピオヂアスターゼ2000	90mg	でんぷん・たん白質を消化します。
リパーゼAP6	45mg	脂肪を消化します。
ホップ乾燥エキス	50mg	胃のはたらきを活発にします。
ケイヒ末	520mg	

添加物：CMC-Ca、D-ソルビトール、ポビドン、トウモロコシデンプン、炭酸水素Na、L-アスパラギン酸Na、DL-アラニン、ヒドロキシプロピルセルロース、マクロゴール、*l*-メントール、香料

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

お問い合わせ先

本製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。

- 1) 天野商事株式会社 お客様相談室
TEL 052-951-2340
(受付時間 9:00～17:00 土・日・祝日を除く)
- 2) 佐藤薬品工業株式会社 医薬情報室
TEL 0744-28-0021
(受付時間 9:00～16:30 土・日・祝日を除く)

発売元



天野商事株式会社

名古屋市中区丸の内三丁目13番12号

製造販売元



佐藤薬品工業株式会社

奈良県橿原市観音寺町9番地の2