

成分	分量	はたらき
センブリ末	5mg	食欲不振を改善する苦味健胃薬です。
チョウジ末	20mg	食欲を増進する芳香健胃生薬です。
ウイキョウ末	40mg	
ビオチン	25mg	炭水化物を消化する酵素です。
プロザイム	30mg	タンパク質を消化する酵素です。
リパーゼAP6	120mg	脂肪を消化する酵素です。
アルジオキサ	200mg	荒れた胃粘膜を保護、修復します。
ウルソデオキシコール酸	30mg	脂肪の消化吸収を助けます。

添加剤：乳糖水和物、CMC-Ca、ヒドロキシプロピルセルロース、*l*-メントール、プロピレングリコール、香料 含有

〈成分・分量に関連する注意〉

服用後、便が緑色になる場合がありますが、銅クロロフィリンナトリウム（緑色）が排泄されるためなので心配いりません。

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わるおそれがあります。)
- (4)1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。
- (5)配置期限を過ぎた製品は服用しないでください。

株式会社パナケイア製薬「お客様相談係」 電話(0766)36-1118
受付時間 9:00~17:00 (土、日、祝日を除く)

製造販売元

 **株式会社パナケイア製薬**
富山県高岡市中田4576番地

01E100

服用に際して、必ずこの説明文書をお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

第2類医薬品

総合胃腸薬

胸やけ、胃の痛み、胃もたれに

新クリエフ胃腸薬 プラス 〈細粒〉

◆新クリエフ胃腸薬プラスは、制酸剤、消化酵素、健胃生薬に加え、胃粘膜を修復する成分や胃の痛みをしずめる成分を配合し、食べすぎ・飲みすぎ・胃の痛み・胃もたれ・胸やけなどの諸症状に、優れた効果を発揮します。



使用上の注意

❌ してはいけないこと

- (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)
1. 次の人は服用しないでください。
透析療法を受けている人
 2. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください。
胃腸鎮痛鎮痙薬
 3. 授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください。
(母乳に移行して乳児の脈が速くなることがあります。)
 4. 長期連用しないでください。



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

裏面もお読みください。

- (1)医師の治療を受けている人
- (2)妊婦又は妊娠していると思われる人
- (3)高齢者
- (4)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
- (5)次の症状のある人
排尿困難
- (6)次の診断を受けた人
腎臓病、心臓病、緑内障

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
□のかわき、便秘、下痢
4. 2週間位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

その他の注意

母乳が出にくくなる場合があります。

効 能 ・ 効 果

胃酸過多、胸やけ、胃部不快感、胃部・腹部膨満感、もたれ(胃もたれ)、胃重、胸つかえ、げっぷ(おくび)、はきけ(むかつき、胃のむかつき、二日酔・悪酔のむかつき、嘔気、悪心)、嘔吐、食べ過ぎ(過食)、飲み過ぎ(過飲)、胃痛、食欲不振(食欲減退)、消化不良、胃弱、消化促進

用 法 ・ 用 量

次の1回量を1日3回、食後または食間に、水またはお湯で服用してください。

年 齢	1回量	1日服用回数
15才以上(成人)	1包	3回
11才以上15才未満	2/3包	
8才以上11才未満	1/2包	
8才未満	服用しないこと	

※食間とは、食後2～3時間を指し、胃の中の食べ物がほぼなくなっている時です。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)定められた用法・用量を厳守してください。
- (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

成 分 ・ 分 量

1日量3包(1包1,400mg)中

成 分	分 量	はたらき
ケイ酸アルミン酸マグネシウム(ノイシリンA)	1,200mg	持続的に胃酸を中和し、胃粘膜を保護します。
炭酸マグネシウム	300mg	即効的に胃酸を中和し、胃酸過多、胸やけを改善します。
炭酸水素ナトリウム	750mg	
銅クロロフィリンナトリウム	48mg	荒れた胃粘膜を修復します。
ロートエキス3倍散	90mg (ロートエキス30mg)	胃の痛みをしずめ、過剰な胃酸の分泌を抑えます。
ケイヒ末	300mg	食欲を増進する芳香健胃生薬です。
ゲンチアナ末	50mg	胃のむかつき、食欲不振を改善する苦味健胃薬です。
カンゾウ末	300mg	胃粘膜の荒れを抑えます。