

胃腸薬 タフクール錠

タフクール錠は、胃腸の不快症状にすぐれた効果を発揮するように、それぞれの有効成分の特性を考慮して配合し、のみやすい錠剤とした胃腸薬で、次のような特徴があります。

- 1.胃痛、胸やけなどの過酸症状の改善に、3種類の制酸剤とロートエキスを配合しています。
- 2.荒れた胃粘膜の修復のために、2種類の胃粘膜修復剤を配合しています。
- 3.胃もたれ、消化不良などの改善に2種類の消化酵素、ウルソデオキシコール酸を配合しています。
- 4.ケイヒとカンゾウの2種類の生薬を配合したのみやすい錠剤です。



使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の人は服用しないでください

透析療法を受けている人。

2. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください

胃腸鎮痛鎮痙薬

3. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください(母乳に移行して乳児の脈が速くなることがあります。)

4. 長期連用しないでください



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

(1) 医師の治療を受けている人。

(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。

(3) 高齢者。

(4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

(5) 次の症状のある人。

排尿困難

(6) 次の診断を受けた人。

腎臓病、心臓病、緑内障、甲状腺機能障害

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

| 関係部位 | 症 状 |
|------|-----------|
| 皮 膚 | 発疹・発赤、かゆみ |

3. 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

口のかわき、便秘、下痢

4. 2週間位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

その他の注意

母乳が出にくくなる場合があります。

効能・効果

食べ過ぎ、飲み過ぎ、消化不良、消化促進、消化不良による胃部・腹部膨満感、食欲不振、胃もたれ、胃重、胃部不快感、胃部膨満感、胃痛、胸やけ、胸つかえ、胃酸過多、げっぷ、はきけ(胃のむかつき、二日酔・悪酔のむかつき、悪心)、嘔吐

用法・用量

下記の量を食後又は食間に水又は温湯で服用してください。

| 年齢 | 1回量 | 1日服用回数 |
|-----------|---------|--------|
| 大人(15歳以上) | 2錠 | 3回 |
| 15歳未満の小児 | 服用しないこと | |

●食間とは「食事と食事の間」のことで、たとえば朝食と昼食の間のことをさします。食事中に服用するというものではありません。

〈用法・用量に関連する注意〉

用法・用量を厳守してください。

成分・分量(6錠中)

●水酸化アルミニウム・炭酸水素ナトリウム共沈物 600mg ●メタケイ酸アルミン酸マグネシウム 200mg ●沈降炭酸カルシウム 300mg ●ウルソデオキシコール酸 12mg ●ロートエキス3倍散 90mg(ロートエキスとして30mg) ●カンゾウ末 200mg ●ケイヒ末 140mg ●ビオザアスターゼ2000 30mg ●リパーゼAP6 45mg ●アルジオキサ 150mg

添加物：D-ソルビトール、セルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、カルメロース、乳糖、l-メントール、ステアリン酸Mg、無水ケイ酸、デキストリン

保管及び取扱い上の注意

- (1) 高温をさけ、直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 水分が錠剤につくと、内容成分の変化のもととなりますので、水滴をおとしたり、ぬれた手で触れないでください。誤って錠剤をぬらした場合は、ぬれた錠剤を廃棄してください。
- (5) ピンの中の乾燥剤は、本剤を使い終わるまで捨てないでください。また、間違って服用しないよう注意してください。
- (6) ピンの中の詰め物(ピニール)は、輸送中に錠剤が破損するのを防止するために入れてあるもので、キャップをあけた後は、必ず捨ててください。
- (7) ピンのキャップのしめ方が不十分な場合、湿気などにより、品質に影響を与える場合がありますので、服用のつどキャップをよくしめてください。
- (8) 使用期限(外箱及びラベルに記載)をすぎた製品は服用しないでください。



本製品に関するお問い合わせは、お買い求めのお店又は
興和株式会社 医薬事業部 お客様相談センターへお願いします。
〒103-8433 東京都中央区日本橋本町三丁目4-14
TEL 03-3279-7755 FAX 03-3279-7566
電話受付時間：月～金(祝日を除く) 9:00～17:00



発売元 興和株式会社 東京都中央区日本橋本町三丁目4-14
製造販売元 株式会社パナケイア製薬 富山県高岡市中田4576番地