

第2類医薬品

胃もたれ・胸やけ・胃の不快感に

漢方胃腸薬〈細粒〉

8種類の生薬成分配合



食前または食間に服用してください。

安中散

芍薬甘草湯

2つの漢方処方を配合した
漢方胃腸薬

あんちゅうさん

安中散

胃腸のはたらきを活発にして
胃もたれ・胃部不快感を改善

しゃくやくかんそうとう

芍薬甘草湯

胃腸の筋肉の緊張をやわらげ
胃痛・腹痛の症状を緩和

服用に際しては、この説明文を必ずお読みください。

【使用上の注意】

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

●次の人は服用しないでください。▷心臓病の診断を受けた人

相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談してください。

- ①医師の治療を受けている人
- ②妊婦または妊娠していると思われる人
- ③高齢者
- ④今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人
- ⑤むくみのある人
- ⑥高血圧、腎臓病の診断を受けた人

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、このケースを持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

まれに、下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症状
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。

2つの漢方処方を配合



胃もたれ、胸やけ、胃の痛みなど
胃腸の諸症状の改善に効果を発揮します。

症状の名称	症状
うっ血性心不全、心室頻拍	全身のだるさ、動悸、息切れ、胸部の不快感、胸が痛む、めまい、失神等があらわれる。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振があらわれる。

3. 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、このケースを持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください。

4. 次の場合は、服用中又は服用後に、医師、薬剤師、または登録販売者に相談してください。▷長期連用する場合

【保管及び取扱い上の注意】



1. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
2. 小児の手の届かない所に保管してください。
3. 他の容器に入れ替えないでください。誤用の原因になったり、品質が変わることがあります。
4. 1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。
5. 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

【効能・効果】

胃痛、腹痛、胃部不快感、胃炎、胃のもたれ、胃酸過多、げっぷ、胸やけ、はきけ、食欲不振、腹部膨満感

【用法・用量】

次の量を食前または食間に服用してください。食間(食事と食事の間)の服用は、食後2～3時間を目安にしてください。

年齢	成人(15歳以上)	5歳以上15歳未満	5歳未満
1回量	 1包	 1/2包	
服用回数	1日3回		服用しないこと

〈用法・用量に関連する注意〉

- ①定められた用法・用量を厳守してください。
- ②小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

【成分・分量】1包(1.2g)中

安中散 700mg (下記生薬の混合粉末):

ケイヒ 200mg、エンゴサク 150mg、ボレイ末 150mg、ウイキョウ 75mg、シュクシャ 50mg、カンゾウ 50mg、リョウキョウ 25mg

芍薬甘草湯エキス末 170mg (下記生薬の抽出乾燥エキス末):

シャクヤク 340mg、カンゾウ 340mg

※添加物として、カルメロースNa、トウモロコシデンプン、乳糖を含有します。

〈成分に関連する注意〉

本剤は生薬を用いた製剤であるため、製品により色が多少異なることがあります。品質に問題はございません。

副作用被害救済制度のお問い合わせ先
(独)医薬品医療機器総合機構
フリーダイヤル 0120-149-931

DMG02MT05P

第2類医薬品

胃もたれ・胸やけ・胃の不快感に

漢方胃腸薬 〈細粒〉

販売名：漢方胃腸薬「SP」(細粒)

発売元：協和薬品工業株式会社

岐阜県岐阜市野一色二丁目8番6号

製造販売元：株式会社サイキョウ・ファーマ

東京都江東区亀戸5丁目6番21号

www.saikyo-pharma.co.jp

お客様相談窓口 (受付・平日 10:00~17:00) ☎ **0120-456-787**

※この医薬品は「台湾」の提携工場で製造された輸入品で、日本の医薬品医療機器等法に基づき出荷前に日本国内にて試験・検査されております。