

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるよう大切に保存してください。

胃腸薬  
胃痛、さしこみ、胃酸過多に

# マリジンAグリーン

## マリジンAグリーンの特長

1. ヨウ化インプロパミドの配合により、胃腸のけいれんを鎮め、過剰な胃酸分泌を改善して胃痛を抑えます。
2. 3種の制酸剤の配合により、過剰な胃酸を中和し、また乾燥水酸化アルミニウムゲルは胃粘膜に被膜をつくり保護します。

## 〔使用上の注意〕



### してはいけないこと

〔守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります。〕

#### 1. 次の人は服用しないでください

- (1) 本剤又は本剤の成分、ヨウ素含有製剤によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (2) 透析療法を受けている人。

#### 2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください

他の胃腸鎮痛鎮痙薬、ロートエキスを含有する他の胃腸薬、乗物酔い薬

#### 3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください

(目のかすみ、異常なまぶしさ等の症状があらわれることがあります。)

#### 4. 長期連用しないでください



### 相談すること

#### 1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 高齢者。
- (4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (5) 次の症状のある人。  
排尿困難、下痢
- (6) 次の診断を受けた人。  
心臓病、腎臓病、緑内障、前立腺肥大症、甲状腺機能障害

#### 2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
精神神経系	頭痛
泌 尿 器	排尿困難
そ の 他	顔のほてり、目のかすみ、異常なまぶしさ

3. 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください  
 □のかわき、便秘、下痢
4. 5～6回服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください

### 〔効能又は効果〕

胃痛、腹痛、さしこみ(疝痛、疝)、胃酸過多、胸やけ

### 〔用法及び用量〕

次の量を食後なるべく30分以内に水又はぬるま湯で服用してください。

年 齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	1包	3回
小児(15歳未満)	服用しないこと	

### 〈用法及び用量に関連する注意〉

用法及び用量を厳守してください。

### 〔成分及び分量〕

マリジンAグリーンは緑色の細粒剤（1包1g）です。

成 分	含量(1包中)	主なはたらき
ヨウ化インプロパミド	2mg	胃腸のけいれんを鎮め、胃酸の過剰な分泌をおさえます。
重質酸化マグネシウム	100mg	過剰な胃酸を中和します。
ケイ酸マグネシウム	200mg	
乾燥水酸化アルミニウムゲル	400mg	胃の粘膜を被覆保護します。

添加物としてラウリル硫酸ナトリウム、サッカリンナトリウム水和物、メチルセルロース、トウモロコシデンプン、銅クロロフィリンナトリウム、ℓ-メントール及び香料を含有します。

### 〔保管及び取扱い上の注意〕

- 直射日光の当たらない、湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください。  
(誤用の原因になったり、品質が変わることがあります。)
- 使用期限（箱に記載）を過ぎた製品は服用しないでください。



### 〔包 装〕

30包

#### お問い合わせ先

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。

**ダンヘルスケア株式会社 お客様相談室**

**TEL 06-6441-0547**

受付時間 9:00～17:00（土、日、祝日を除く）

発 売 元 **ダンヘルスケア株式会社**  
 大阪市西区土佐堀1丁目4番11号

製造販売元 **佐藤薬品工業株式会社**  
 奈良県橿原市観音寺町9番地の2