

A-COOP クミアイ
けんぷく錠「エス」

鎮痛胃腸薬

特 徴

- 2種類の鎮^{ちんけい}痙薬が内臓の痛みをしずめ、暴飲・暴食をはじめ、いろいろな原因で起こる急な胃痛・腹痛・さしこみなどを素早く解消するはらい止めの薬です。
- 2種類の制酸薬の配合により胃酸過多や胸やけなどの症状にも効果的です。



使用上の注意

してはいけないこと



(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります。)

1. 次の人は服用しないでください。
 - (1)6歳未満の乳幼児
 - (2)透析療法を受けている人
2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください。

他の胃腸鎮痛鎮痙薬、ロートエキスを含有する他の胃腸薬、乗物酔い薬
3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください。

(眠気や目のかすみ、異常なまぶしさ等の症状があらわれることがあります。)
4. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください。

(母乳に移行して乳児の脈が速くなることがあります。)
5. 長期連用しないでください。

相談すること



1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - (1)医師の治療を受けている人
 - (2)妊婦又は妊娠していると思われる人
 - (3)高齢者
 - (4)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - (5)次の症状のある人：排尿困難
 - (6)次の診断を受けた人：心臓病、腎臓病、緑内障、甲状腺機能障害
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
精神神経系	頭痛
泌 尿 器	排尿困難
そ の 他	顔のほてり、異常なまぶしさ

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

口のかわき、便秘、下痢、目のかすみ
4. 5～6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

その他の注意





母乳が出にくくなる場合があります。

効能・効果

胃痛、腹痛、さしこみ(疝痛・癢)、胃酸過多、胸やけ

用法・用量

服用間隔は4時間以上おいてください。

年齢	1回量	服用回数
15歳以上	3錠 	1日2回まで
11歳～14歳	2錠 	
8歳～10歳	1錠半 	
6歳～7歳	1錠 	
6歳未満	服用しないこと	



<用法・用量に関連する注意>

- (1) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (2) 錠剤の取り出し方
図のように錠剤の入っているPTPシートの凸部を指先で強く押して、裏面のアルミ箔を破り、取り出して服用してください。(誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながります。)



成分・分量 1日量(6錠)中

成分	含量	はたらき
パパベリン塩酸塩	50mg	内臓平滑筋に作用して筋のけいれんをしずめ、腹痛をおさえます。
ロートエキス	30mg	消化管の運動をゆっくりにし、胃液の分泌をおさえ、胃の痛みやけいれんをやわらげます。
アミノ安息香酸エチル	330mg	胃粘膜麻酔作用により、胃痛をおさえます。
沈降炭酸カルシウム	250mg	胃内の余分な酸を中和して、胸やけなどの不快な症状を解消します。
メタケイ酸アルミン酸 マグネシウム	200mg	制酸効果とともに、胃粘膜の炎症面を保護します。

添加物として、バレイショデンプン、デキストリン、ヒドロキシプロピルセルロース、ステアリン酸Mgを含有する。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり、品質が変わります。)
- (4) 使用期限(外箱に記載)を過ぎた製品は服用しないでください。

お問い合わせ先

クマイイ家庭薬相談窓口 ☎ 0238(46)2013
月～金曜日 9:00～17:00 (祝日を除く)

販売者 **全国農業協同組合連合会**
東京都千代田区大手町1-3-1

製造販売者 **協同薬品工業株式会社**
山形県東置賜郡川西町大字西大塚930