

胃痛・腹痛に

第2類医薬品

赤玉小粒 赤玉はら-B



発売元
和平製薬株式会社
奈良県葛城市弁之庄380番地1
TEL 0745(69)2006

2包入(1包30粒)¥250+税

副作用被害救済制度
☎0120-149-931

製造販売元：三星製薬株式会社 TEL 0745-65-2130
奈良県御所市153番地

配置 期限

第2類医薬品 (品名：赤玉胃腸丸)

(4) 期限を過ぎた製品は服用しないで下さい。

(3) 他の容器に入れ替えないで下さい。

(2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。

(1) 直射日光の当たらない涼しい所に密封して保管して下さい。

保管及び取扱上の注意

添加として、クマリン酸、重曹、酸化チタン、シリカ、ヒドロキシソド

セリウム…0.05g、ローゼキア…0.06g

本剤1包…0.30g、本剤10包…1.70g、クマリン酸…0.50g、

ローゼキア…0.05g、重曹…0.06g

(2) 3歳以上の幼児にのみ、3歳未満の幼児には服用しないで下さい。

(1) 小児に服用させる場合には、服用の回数・量のほか、年齢に応じた注意

用法及び用量に関する注意

1日3回食後水又は白湯で服用する。服用量は4歳以上でと、

3歳以上歳未満(1回)……………7粒(約1/4包)

5歳以上8歳未満(1回)……………10粒(1/3包)

8歳以上11歳未満(1回)……………15粒(1/2包)

11歳以上15歳未満(1回)……………20粒(2/3包)

15歳以上(1回)……………30粒(1包)

用法・用量

胃痛、腹痛、さしこみ(紅痢、痢)、胃酸過多、胸やけ

効能・効果

母乳の出しにくくなる場合があります。

その他の注意

使用上の注意

△ 使用上の注意

☒ してはいけないこと

(守らなければならぬ) 現在、症状がひどい、服用量・回数が増える、

1. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないで下さい。

2. 服用後、嘔吐又は稀便等の副作用をあらわさないで下さい。

3. 服用中、本剤を服用しない、本剤を服用する場合は乳を避けて下さい。

相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

(1) 医師の治療を受けている人。

(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。

(3) 高齢者。

(4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

(5) 次の症状のある人。排便困難

(6) 次の診断を受けた人。心臓病、緑内障

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は直ちに服用を中止し、この

文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

3. 服用後、次の症状があらわれたことがあるので、このよう症状の

持続又は増悪が見られた場合には、服用を中止し、医師、薬剤師又は

4. 5〜6回服用しても症状がなおかならない場合は服用を中止し、この

文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

胃腸病	症状
便秘	嘔吐、腹痛、下痢、
腹痛	嘔吐、下痢、
嘔吐	嘔吐、下痢、
下痢	嘔吐、下痢、
その他	嘔吐、下痢、