

# Kracie

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるように大切に保管してください。

第2類医薬品

下痢・食あたり・水あたり

止しゃ薬（下痢止め）

## ワカ末止瀉薬錠

### 特 徴

- ベルベリン塩化物水和物とゲンノショウコエキスによっておなかの調子を整え、下痢・食あたり・水あたり・軟便などに効果があります。
- 服用しやすいフィルムコーティング錠です。

### ⚠ 使用上の注意



#### 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
  - (1) 医師の治療を受けている人
  - (2) 発熱を伴う下痢のある人、血便のある人又は粘液便の続く人
  - (3) 急性の激しい下痢又は腹痛・腹部膨満・はきけ等の症状を伴う下痢のある人（本剤で無理に下痢をとめるとかえって病気を悪化させることがあります。）
  - (4) 高齢者
2. 5～6日間服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

### 効 能

下痢、消化不良による下痢、食あたり、はき下し、水あたり、くだり腹、軟便

### 用法・用量

1日3回を限度とし服用する。服用間隔は4時間以上おいてください。

年 齢	1回量	1日服用回数
成人（15才以上）	2錠	3回
15才未満8才以上	1錠	
8才未満	服用しないこと	

#### 〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (2) 錠剤の取り出し方  
右図のように錠剤の入っているPTPシートの凸部を指先で強く押し、裏面のアルミ箔を破り、取り出して服用してください。  
(誤ってそのままのみ込んだりすると食道粘膜に突き刺さるなど思わぬ事故につながります。)



### 成 分

成人1日の服用量6錠（1錠155mg）中、次の成分を含んでいます。  
ベルベリン塩化物水和物…………… 225mg  
ゲンノショウコエキス…………… 600mg（原生薬4gに相当）  
添加物として、無水ケイ酸、CMC-Ca、セルロース、ケイ酸Al、ステアリン酸Mg、ヒプロメローズ、酸化チタン、三二酸化鉄、カルナウバロウを含有する。

### 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。  
(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。
- (5) 水分が錠剤につきますと、変色または色むらを生じることがありますので、誤って水滴を落としたり、ぬれた手で触れないでください。  
(裏面につづきます)

本剤について、何かお気づきの点がございましたら、お買い求めのお店  
又は下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

クラシエ 薬品株式会社 お客様相談窓口 ☎ (03) 5446-3334  
受付時間 10:00~17:00 (土、日、祝日を除く)

Read before using and retain for future reference.

For diarrhea, food poisoning and water poisoning  
Antidiarrheals  
**WAKAMATU SHISHAYAKU TABLETS**

#### Features

- Berberine chloride and extract of *Geranium thunbergii* adjust the bowel conditions to mitigate the effects of diarrhea, food poisoning, water poisoning and soft stool.
- Easy-to-take film coated tablet type of medicine

#### Precautions

##### Consultation

1. The following persons should contact a physician, pharmacist, or registered salesperson for a consultation before using this medicine.
  - (1)Patients undergoing medical treatment from a physician.
  - (2)Those who have diarrhea with fever, bloody stool or persistent mucous stool.
  - (3)Those who have acute and severe diarrhea or diarrhea with accompanying symptoms such as abdominal pain/abdominal distension/sick feeling. (The disease may worsen by taking this medicine to stop diarrhea.)
  - (4)The elderly.
2. If your symptoms do not improve after 5 to 6 days of use, stop taking this medicine and consult a physician, pharmacist or registered salesperson, being sure to take this instruction leaflet with you.

#### Indications

Diarrhea, diarrhea due to indigestion, food poisoning, vomiting with diarrhea, water poisoning, loose bowels, and soft stool.

#### Dosage and Administration

Take the following dose up to 3 times a day, at intervals of at least 4 hours.

Age	Dose	Doses per day
Adults(15 years and over)	2 tablets	3
Children 8 to 14 years	1 tablet	3
Children under 8 years	Do not use	

#### Dosing precautions

- (1)Administer to children under adult supervision.
- (2)How to take out a tablet

As shown in the right figure, with your fingertip strongly push the convex portion of the PTP sheet containing a tablet. (Swallowing a tablet without removing the PTP sheet by mistake may cause unexpected problems such as the PTP sheet sticking to the mucous membrane of the throat.)

(How to remove medicine  
from the PTP sheet.)

Push out the tablet



#### Composition

6 tablets (155 mg per tablet) to be taken by an adult per day contain the following ingredients.

Berberine Chloride Hydrate : 225 mg

Extract of *Geranium thunbergii* : 600 mg (corresponding to 4 g of crude drug)

The additives Light Anhydrous Silicic Acid, Carmellose Calcium, Microcrystalline Cellulose, Synthetic Aluminum Silicate, Magnesium Stearate, Hypromellose, Titanium Oxide, Yellow Ferric Oxide, Carnauba Wax are contained.

#### Precautions for storage and handling

- (1)Store in a cool dry place away from direct sunlight.
- (2)Keep out of reach of children.
- (3)Do not transfer the medicine to a different container. (It may lead to misuse or alter the quality of the drug.)

Distributed by **Kracie Pharmaceutical, Ltd.**  
20-20, Kaigan 3-chome,  
Minato-ku, Tokyo 108-8080, Japan.  
Manufactured and **Kracie, Ltd.**  
Distributed by 20-20, Kaigan 3-chome,  
Minato-ku, Tokyo 108-8080, Japan.

ホームページ [www.kracie.co.jp](http://www.kracie.co.jp)

発売元 **クラシエ 薬品株式会社**  
東京都港区海岸3-20-20 (〒108-8080)

製造販売元 **クラシエ株式会社**  
東京都港区海岸3-20-20 (〒108-8080)