



2013年2月 記載要領変更に伴う改訂

**第2類
医薬品**

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時読めるよう大切に保管してください。



止瀉薬
下痢・食あたりに

テスミンエースは…

テスミンエース®

有害菌、食べすぎ、寝冷え、ストレスなどによる下痢、腹痛、軟便、はき下しに効果をあらわします。

⚠ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと

- (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)
1. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください
胃腸鎮痛鎮痙薬、ロートエキスを含有する他の胃腸薬、乗物酔い薬
 2. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください
(目のかすみ、異常なまぶしさ等の症状があらわれることがあります)
 3. 授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください
(母乳に移行して乳児の脈が速くなる場合があります。)
 4. 服用前後は飲酒しないでください
 5. 1週間以上継続して服用しないでください

👤 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 発熱を伴う下痢のある人、血便のある人又は粘液便の続く人。
 - (3) 急性の激しい下痢又は腹痛・腹部膨満・はきけ等の症状を伴う下痢のある人。
(本剤で無理に下痢をとめるとかえって病気を悪化させることがあります。)
 - (4) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (5) 小児。
 - (6) 高齢者。
 - (7) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (8) 次の症状のある人。
排尿困難
 - (9) 次の診断を受けた人。
心臓病、胃・十二指腸潰瘍、緑内障
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください



関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
精神神経系	頭痛
泌 尿 器	排尿困難
そ の 他	顔のほてり、異常なまぶしさ

3. 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。
口のかわき、目のかすみ
4. 5~6回服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください



その他の注意

母乳が出にくくなることがあります。

〔効能〕

下痢、消化不良による下痢、食あたり、はき下し、水あたり、くだり腹、軟便、腹痛を伴う下痢

〔用法・用量〕

下記の1回服用量を服用します。服用間隔は4時間以上おいてください。

年齢	1回服用量	1日服用回数
大人(15才以上)	2カプセル	3回を限度とします
8~14才	1カプセル	
8才未満	服用しないでください	

〔用法・用量に関連する注意〕

- (1) 定められた用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (3) **カプセルの取り出し方**
右図のようにカプセルの入っているPTPシートの凸部を指先で強く押し、裏面のアルミ箔を破り、取り出してお飲みください。(誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながります。)



〔成分・分量と働き〕6カプセル中

成分	分量	働き
ベルベリン塩化物水和物	200mg	消炎作用及び腸内の殺菌作用があり、下痢に伴う腸内環境を改善します。
次硝酸ピスマス	1,400mg	収れん作用、腸内粘膜の保護作用があり、下痢などに効果をあらわします。
有孢子性乳酸菌末T	200mg	胃酸で分解されず、腸内で発芽・繁殖し、整腸効果をあらわします。
ロートエキス	60mg	アルカロイド類が主成分で、腸の激しいぜん動や痛みを抑え、腹痛や下痢に効果をあらわします。

添加物として、セルロース、トウモロコシデンプン、ステアリン酸Mg、タルク、ゼラチン、ラウリル硫酸Naを含有します。

◎保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わるおそれがあります。)
- (4) 使用期限をすぎた製品は、服用しないでください。
- (5) カプセル剤は、吸湿しやすいので、ぬれた手などで、触れないように注意してください。



副作用被害救済制度のお問い合わせ先
(独)医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
電話 0120-149-931 (フリーダイヤル)

本製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。
佐藤製薬株式会社 お客様相談窓口
電話 03(5412)7393
受付時間：9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

製造販売元(輸入)
佐藤製薬株式会社
東京都港区元赤坂1丁目5番27号
MANUFACTURED BY
SATO PHARMACEUTICAL CO., LTD. TAIWAN
IMPORTED & DISTRIBUTED BY
SATO PHARMACEUTICAL CO., LTD. JAPAN
MADE IN TAIWAN