

この説明書は、本剤とともに保管し、服用の際には、よくお読みください。

くぐりはら、食あたりに和漢生薬主剤

小粒赤玉はら薬

第2類医薬品

「小粒赤玉はら薬」は配合される7種類の和漢生薬の働き(腸内殺菌作用、腸収れん作用、整腸・健胃作用)により、消化不良による下痢、くぐり腹、食あたりなどに効果があります。

⚠ 使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 発熱を伴う下痢のある人、血便のある人又は粘液便の続く人。
- (3) 急性の激しい下痢又は腹痛・腹部膨満・はき気等の症状を伴う下痢のある人。
(本剤で無理に下痢をとめるとかえって病気を悪化させることがある。)
- (4) 高齢者。

2. 5～6日間服用しても症状がよくなりない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

効能・効果

下痢、消化不良による下痢、食あたり、はき下し、水あたり、くぐり腹、軟便

用法・用量

次の量を1日3回を限度として服用してください。

ただし、服用間隔は4時間以上おいてください。

年 齢	1 回 量	服用回数
成人 (15才以上)	30粒	1日3回 を限度
11才以上15才未満	20粒	
8才以上11才未満	15粒	
5才以上8才未満	10粒	

〈用法及び用量に関連する注意〉

- (1) 定められた用法、用量を厳守してください。
- (2) 5歳以上の幼児、小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (3) 本剤は、5才未満の乳幼児に服用させないでください。

(裏面につづく)

成分・作用

成分	90粒中	作用
オウレン末	100mg	下痢止、苦味健胃薬として、胃弱、食欲不振、むかつき等に用いられます
オウバク末	570mg	腸内殺菌作用、苦味健胃作用により下痢をとめます
ゲンノショウコ末	900mg	腸収れん作用、整腸作用により下痢をとめます
ヨウバイヒ末	450mg	腸収れん作用により下痢をとめます
ゲンチアナ末	150mg	苦味健胃薬として食欲不振、消化不良に効果があります
ショウキョウ末	75mg	胃腸の働きを良くし、芳香性辛味薬として、健胃消化薬に用いる
ダイオウ末	75mg	緩下薬として、胃腸薬に配合され、胃腸の働きを調整し、高血圧、消炎薬として用いる

添加物としてデヒドロ酢酸ナトリウム、サリチル酸、沈降炭酸カルシウム、寒梅粉、タルク、炭酸カルシウム、酸化チタン、アラビアゴム末、ゼラチン、赤色3号、黄色5号色素を含む。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)
- (4) 1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。

(5) 配置期限(外装に記載)をすぎた製品は服用しないでください。

お問い合わせ先

本剤について何かお気づきの点がございましたら、下記までご連絡ください。

布亀株式会社 お客様相談室

TEL : (0798) 35-9985

受付時間：午前9:00から午後5:00まで
(土、日、祝日を除く)

発 売 元 **布亀株式会社**

〒663-8585

兵庫県西宮市今津二葉町3番6号

製造販売元 **富山薬品株式会社**

〒930-2241

富山県富山市四方西岩瀬石瀬175

下痢は、大腸(結腸)で水分の吸収が十分に行なわれなくなったときに起こります。

その原因は、

- ① 細菌感染により腸内細菌のバランスがこわれたとき(食中毒の疑いがある場合は、医師の診断を受けてください)
- ② 食べすぎ、飲みすぎなどにより腸が異常運動を起こし、食物が腸を通過する時間が早まり水分を十分吸収しないうちに直腸にきてしまったとき
- ③ 腸の働きが悪くなり水分の吸収力が弱くなっているとき
- ④ ストレスや過労などが考えられます。