

服用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

止瀉薬 イツミ正露丸

第2類医薬品

食べ過ぎ、飲み過ぎ、冷えなどや、とくに夏場に見られるように胃腸機能が低下しますと、とかく下痢を起します。こんなときに止瀉薬を服用してください。
イツミ正露丸は腸内殺菌剤などが配合された止瀉薬(下痢止め)です。
なお、「イツミ正露丸」は丸剤特有の製造方法のためやや湿った軟かい丸剤であります。



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起りやすくなる)

1. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないこと
胃腸鎮痛鎮痙薬
2. 授乳中の人には本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けること
(母乳に移行して乳児の脈が速くなることもある。)



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 発熱を伴う下痢のある人、血便のある人又は粘液便の続く人。
 - (3) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (4) 高齢者。
 - (5) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
 - (6) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (7) 次の症状のある人。
排尿困難
- (8) 次の診断を受けた人。
心臓病、緑内障
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること
 - (1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	食欲不振、胃部不快感

- (2) 5~6日間服用しても症状がよくなる場合
3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談すること
口のかかわ、便秘、下痢

その他の注意

母乳が出にくくなることもある。

効能・効果

下痢、消化不良による下痢、食あたり、はき下し、水あたり、くだり腹、軟便

用法・用量

次の量を1日3回食後、湯又は水にて服用する。

年 齢	1 回 量	1日服用回数
大人 (15歳以上)	3 粒	3 回
8歳以上15歳未満	2 粒	
5歳以上8歳未満	1 粒	
5 歳 未 満	服用しないこと	

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 用法及び用量を厳守すること。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

成分・分量

9粒〔大人の1日服用量〕中、次の成分を含有する。

成 分	9粒中	作 用
日本薬局方木クレオソート	275mg	殺菌作用
日本薬局方ロートエキス	19.8mg	鎮痛・鎮痙作用
日本薬局方ケイヒ末	49.5mg	健胃作用
日本薬局方オウバク末	99mg	健胃作用
日本薬局方カンゾウ末	165mg	鎮痛・鎮痙作用
チンピ末	105mg	健胃作用

添加物として、炭酸水素Na、グリセリン、コムギデンプンを含有する。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること。又温度差のはげしい所では容器の内側に水滴が生じることがありますが、使用には問題はありません。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4) 使用期限をすぎたものは服用しないこと。

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

本草製薬株式会社 お客様相談室
〒468-0046 名古屋市中天白区古川町125番地
電 話：052-892-1287(代表)
受付時間：月～金曜日 9：00～17：00(土、日、祝日を除く)

【副作用被害救済制度】電話：0120-149-931

▼製造販売元

和泉薬品工業株式会社
大阪府和泉市芦部町181番地

▼発売元

本草製薬株式会社
名古屋市中天白区古川町125番地