

服用前にこの説明書を必ずお読みください。  
また、必要なときに読めるように保管してください。

＜生薬配合＞ 止瀉薬

第2類医薬品

# 赤玉止瀉薬

《赤玉止瀉薬》は生薬を主体に炭酸水素ナトリウム（制酸剤）を配合した下痢止め薬です。

消化不良や、寝冷えなどによる下痢、食あたり、水あたり、はき下し、軟便などに効きめがあります。

生活上の留意点としては、暴饮暴食や、消化の悪い食べもの、熱すぎたり、冷たすぎる飲食物の摂取をさけ、食事時間を守り、よくかんで食べるなど、正しい食習慣をつけることが肝要です。



## 使用上の注意



### 相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
  - 医師の治療を受けている人。
  - 発熱を伴う下痢のある人、血便のある人又は粘液便の続く人。
  - 高齢者。
- 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師、又は登録販売者に相談すること  
便秘、下痢
- 5～6日間服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

## ■ 効能又は効果

下痢、消化不良による下痢、食あたり、はき下し、水あたり、くだり腹、軟便。

## ■ 用法及び用量

1日3回食間に服用する。

年 齢	1 回 量	1 日 服 用 回 数
成 人（15 歳 以 上）	1 包（30 粒）	3 回
11 歳 以 上 15 歳 未 満	20 粒	
7 歳 以 上 11 歳 未 満	15 粒	
3 歳 以 上 7 歳 未 満	10 粒	
3 歳 未 満 の 乳 幼 児	服 用 し な い こ と	

<用法・用量に関連する注意>

- (1) 用法及び用量を厳守してください。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (3) 3歳以上の幼児に服用させる場合には、薬剤がのどにつかえることのないよう、よく注意してください。

## ■ 成分及び分量 3包（大人1日量：90粒）中

オウバク末	2.0 g
オウレン末	0.1 g
センブリ末	0.1 g
コウボク末	1.0 g
モッコウ末	1.0 g
ケイヒ末	0.5 g
炭酸水素ナトリウム	0.5 g

添加物として酸化チタン、タルク、ヒドロキシプロピルセルロース、赤色102号、黄色5号を含有する。

## ■ 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない、湿気の少ない涼しいところに保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わることがあります）

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店  
又は下記にお願い申し上げます。  
占部大観堂製薬株式会社 電話 0949-22-0299

製造販売元



占部大観堂製薬株式会社  
福岡県直方市大字知古1761-74