

三和正露丸

 (止瀉薬)

三和正露丸は特異なおおいを有した褐色の丸剤で、腸内異常発酵を抑制する木クレオソートを主薬とし、健胃、整腸、鎮痛、鎮けい作用をそれぞれ有する生薬を配合しております。

下痢、食あたり等の症状には、三和正露丸を服用されると共に、十分に水分を補給して体力の低下を予防して下さい。

▲ 使用上の注意*



【相談すること】

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
 - 医師の治療を受けている人。
 - 発熱を伴う下痢のある人、血便又は粘液便の続く人。
 - 高齢者。
- 服用後、次の症状があらわれた場合は直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

| 関係部位 | 症 状 |
|------|------------|
| 消化器 | 食欲不振、胃部不快感 |

- 5～6日間服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

〈効能・効果〉

下痢、消化不良による下痢、食あたり、はきくだし、水あたり、くだり腹、軟便

〈用法・用量〉

次の1回量を食後なるべく30分以内に、水又はお湯と一緒にかまわずに服用して下さい。

| 年 齢 | 1 回 量 | 1 日 服 用 回 数 |
|------------|---------|-------------|
| 成人 (15才以上) | 4 粒 | 3 回 |
| 11才以上15才未満 | 3 粒 | |
| 5才以上11才未満 | 2 粒 | |
| 5才未満 | 服用しないこと | |

- 定められた用法、用量を厳守して下さい。
- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させて下さい。
- 本剤は5才未満の乳幼児に服用させないで下さい。なお5才以上であっても幼児に服用させる場合には、丸剤がのどにつかえることのないよう、よく注意して下さい。
- 歯にはつめないで下さい。

〈成分・分量〉 (1日量12粒中)

| 成 分 | 含 量 | 作 用 | |
|----------|-------|--------|---------------------------------------|
| 木クレオソート | 0.25g | 殺 菌 | 腸内異常発酵を抑えます。 |
| ゲンノショウコ末 | 0.31g | 整 腸 | 腸内の働きを回復させ、便通を整えます。 |
| ケイヒ末 | 0.10g | 健 胃 | 胃液や消化液の分泌をうながし、弱った胃腸の働きを回復させ、調子を整えます。 |
| カンゾウ末 | 0.20g | 鎮痛 鎮けい | 過度の胃腸の緊張をおだやかにします。 |

添加物：トウヒ末、グリセリン、寒梅粉

〈保管及び取扱い上の注意〉

- 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管して下さい。ただし、冷蔵庫には保管しないで下さい。
- 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- 他の容器に入れ替えないで下さい (誤用の原因になったり、品質が変わるおそれがあります)。
- 使用期限を過ぎた製品は服用しないで下さい。

お問い合わせ先 電 話 (072) 985-7161

受付時間：午前9:00～午後5:00まで (土、日、祝日を除く)

三和正露丸本舗

製造販売元



三和薬品工業株式会社

大阪府東大阪市東石切町5丁目1番20号