

服用に当たって、この説明文書を必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるよう大切に保存してください。

胃腸のくすり

百

草

第2類医薬品

百草は腸内異常発酵によっておこる腹痛、下痢、食あたりなどの症状にすぐれた効果をあらわす昔ながらの胃腸良薬です。

### ⚠ 使用上の注意

#### ❌ してはいけないこと


（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります）

1. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください  
胃腸鎮痛鎮痙薬、ロートエキスを含有する他の胃腸薬、乗物酔い薬
2. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください  
（目のかすみ、異常なまぶしさ等の症状があらわれることがあります。）
3. 授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください  
（母乳に移行して乳児の脈が速くなる場合があります。）



#### 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください  
(1)医師の治療を受けている人。  
(2)発熱を伴う下痢のある人、血便のある人又は粘液便の続く人。  
(3)妊婦又は妊娠していると思われる人。  
(4)高齢者。  
(5)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。  
(6)次の症状のある人。  
排尿困難  
(7)次の診断を受けた人。  
心臓病、緑内障



2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
精神神経系	頭痛
泌尿器	排尿困難
その他	顔のほてり、異常なまぶしさ

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください  
口のかわき、目のかすみ
4. 5～6日間服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

#### その他の注意

母乳が出にくくなる場合があります。

## 効能・効果

下痢、消化不良による下痢、食あたり、はき下し、水あたり、くだり腹、軟便、腹痛を伴う下痢

## 用法・用量

大人（15歳以上）	1回	20粒
11歳以上15歳未満	1回	13粒
8歳以上11歳未満	1回	10粒
5歳以上8歳未満	1回	6粒
3歳以上5歳未満	1回	5粒

1日3回を限度として服用します。  
服用間隔は4時間以上おいてください。



### <用法・用量に関連する注意>

- (1)用法・用量を厳守してください。
- (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (3)3歳以上の幼児に服用させる場合には、薬剤がのどにつかえることのないよう、よく注意してください。

## 成分・分量（60粒中）

オウバク乾燥エキス（オウバク3gに相当）	0.5g
ロートエキス	0.03g
ゲンノショウコ末	1.682g
アセンヤク末	0.25g

添加物として、安息香酸Na、香料（*l*-メントール）、薬用炭、セラック、アラビアゴム末、グリセリンを含有します。

## 保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください（誤用の原因になったり品質が変わります。）。
- (4)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。



副作用被害救済制度の問合せ先  
(独) 医薬品医療機器総合機構  
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>  
☎ 0120-149-931(フリーダイヤル)

お客様相談室 大生堂薬品工業株式会社 ☎058-271-9481  
(9:00~17:00 土、日、祝日を除く)

製造販売元 **大生堂薬品工業株式会社**  
岐阜市六条大溝3丁目3番17号