

この説明書は本剤とともに保管し、服用に際しては必ずお読みください。
また、必要などに読めるよう大切に保存してください。

止瀉薬

第2類医薬品

赤玉はら薬

赤玉はら薬は、様々な原因によって起こる下痢症状を和らげて、
おなかの調子を整える和漢薬成分が中心のお薬です。

⚠ 使用上の注意



相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - 医師の治療を受けている人。
 - 発熱を伴う下痢のある人、血便のある人又は粘液便の続く人。
 - 高齢者。
- 5～6日間服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

効能・効果

下痢、消化不良による下痢、食あたり、はき下し、水あたり、くだり腹、軟便

用法・用量

年齢	1回量	1日服用回数
15歳以上	10粒	食前に3回 ※食前とは食事の30分 前頃を指します
11歳以上 15歳未満	7粒	
8歳以上 11歳未満	5粒	
5歳以上 8歳未満	4粒	
3歳以上 5歳未満	3粒	
3歳未満	服用させないでください。	

【用法・用量に関連する注意】

- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- 3歳以上の幼児に服用させる場合には、薬剤がのどにつかえることのないよう、よく注意してください。
- 定められた用法・用量を厳守してください。

成分・分量

1日量(30丸)中

成分	分量	作用
タンニン酸ベルベリン	120 mg	止瀉作用により、下痢にすぐれた効果をあらわします。
アクリノール水和物	60 mg	静菌・殺菌作用があり、食あたり・水あたりに効果をあらわします。
ゲンノショウコエキス (原生薬換算量)	300 mg (3000 mg)	止瀉薬・整腸薬としてはたらき、便通を整えます。
センブリ末	30 mg	苦味健胃生薬及び整腸薬として、消化不良に効果をあらわします。
添加物として、炭酸Ca、カルメロースCa、デヒドロ酢酸Na、コメデンブ、カルメロースNa、パレイショデンブ、タルク、セラック、マクロゴール、赤色102号を含有。		

保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わってしまいます)
- 使用期限を過ぎたものは服用しないでください。
- お薬の入っている袋を開封後、3日経過したものは服用しないでください。

お問い合わせ先

中央薬品株式会社 お客様相談窓口
 電話 076-493-5010
 受付時間 9時～17時(土・日・祝日を除く)

製造販売元

ズバリ 中央薬品株式会社
 富山県富山市西四十物町4-9
 副作用救済制度 ☎ 0120-149-931