

販売名：赤玉はら薬

第2類医薬品



使用上の注意

相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 発熱を伴う下痢のある人、血便のある人又は粘液便の続く人。
 - (3) 高齢者。
2. 5～6日間服用しても症状がよくなりない場合は服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります)
- (4) 使用期限を過ぎたものは服用しないでください。
- (5) お薬の入っている袋を開封後、3日経過したものは服用しないでください。

お客様相談窓口 中央薬品株式会社
電話076-493-5010
月～金(祝日を除く)9時～17時

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931

効能・効果

下痢、消化不良による下痢、食あたり、はき下し、水あたり、くんだり腹、軟便

用法・用量

次の1回量を1日3回食前に服用してください。

15歳以上	1回10粒
11歳以上15歳未満	1回7粒
8歳以上11歳未満	1回5粒
5歳以上8歳未満	1回4粒
3歳以上5歳未満	1回3粒
3歳未満は服用しないでください。	

【用法・用量に関連する注意】

- (1) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (2) 3歳以上の幼児に服用させる場合には、薬剤がのどにつかえることのないよう、よく注意してください。
- (3) 用法・用量を厳守してください。

成分・分量 1日量(30粒中)

センブリ末	30mg
アクリノール水和物	60mg
タンニン酸ベルベリン	120mg
ゲンノショウコエキス	300mg

(本品300mgは原生薬3000mgに相当)

添加物として、炭酸Ca、カルメロースCa、デヒドロ酢酸Na、コメデンプン、カルメロースNa、バレイショデンプン、タルク、セラック、マクロゴール、赤色102号、黄色5号を含有。