

赤玉ベリンはら薬(止瀉薬)

第2類医薬品



使用上の注意

してはいけないこと



(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

1. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないで下さい。

胃腸鎮痛鎮痙薬、ロートエキスを含有する他の胃腸薬、乗物酔い薬

2. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないで下さい。

(目のかすみ、異常なまぶしさ等の症状があらわれることがあります)

3. 授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けて下さい。

(母乳に移行して乳児の脈が速くなることがあります)

相談すること



1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

(1) 医師の治療を受けている人

(2) 発熱を伴う下痢のある人、血便のある人又は粘液便の続く人

(3) 妊婦又は妊娠していると思われる人

(4) 高齢者

(5) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人

(6) 次の症状のある人

排尿困難

(7) 次の診断を受けた人

心臓病、緑内障

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
精神神経系	頭痛
泌尿器	排尿困難
その他	顔のほてり、異常なまぶしさ

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

口のかわき、目のかすみ

4. 5~6日間服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

裏面もお読み下さい

他の注意

母乳が出にくくなることがあります。

効能・効果

下痢、消化不良による下痢、食あたり、はき下し、水あたり、くだり腹、軟便、腹痛を伴う下痢

用法・用量

年齢	1回量	1日服用回数
15歳以上(大人)	6錠	2回を限度とする
11歳以上15歳未満	5錠	
8歳以上11歳未満	4錠	
5歳以上8歳未満	3錠	
5歳未満	服用しないこと	

服用間隔は4時間以上おいて下さい。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)用法・用量を厳守して下さい。
- (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させて下さい。

成分・分量 1日量(12錠)中

ペルベリン塩化物水和物 180mg

ロートエキス3倍散 90mg

センブリ末 105mg

添加物としてバレイショデンプン、乳糖水和物、デヒドロ酢酸Na、タルク、ヒドロキシプロピルセルロース、赤色3号、セルロース、カルメロースCa、ステアリン酸Mg、マクロゴール、ポリビニルアセタールジエチルアミノアセテート、酸化チタン、カルナウバロウを含有する。

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。
- (2)小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3)他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり品質が変わります)
- (4)表示の期限を過ぎた製品は服用しないで下さい。

お問い合わせ先

中新薬業株式会社 お客様相談室

電話 076(475)2121

受付時間 9:00~16:00 (土、日、祝日を除く)