

生薬製剤

第2類医薬品

登録商標



医学博士松本順先生御肖像

ニチイ胃腸丸

はらぐすり

数々の大和心を
乾向ふ向ふ山桜花

日本医薬品製造株式会社 奈良県御所市古瀬18番地

販売名 **ニチイ胃腸丸** 医薬品

【効能・効果】

下痢、消化不良による下痢、食あたり、はき下し、水あたり、くだり腹、軟便、腹痛を伴う下痢。

【用法・用量】

15才以上……………1回30粒 11才以上15才未満…1回20粒
8才以上11才未満…1回15粒 5才以上 8才未満…1回10粒
1日3回食後服用

- (1) 用法及び用量を厳守すること。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

【成分・分量】 1日量(90粒)中

日局 センブリ末……………600mg	日局 ゲンノショウコ末……………600mg
日局 オウゴン末……………450mg	日局 カンゾウ末……………300mg
日局 塩化ペルベリン……………280mg	日局 ロートエキス散……………300mg
局外生規ヨウバイヒ末……………300mg	
別紙規格胆汁エキス末……………150mg	

添加物として、ケイヒ末、カルメロースCa、リン酸水素Ca、バレイショ、デンプン、テヒドロ酢酸Naを含有する。

注 意

1. 小児の手の届かない所に保管すること。
2. 服用に際しては、使用上の注意をよく読むこと。
3. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。

1包量 (30粒) 2包入 ¥250.

製造販売元 日本医薬品製造株式会社 奈良県御所市古瀬18番地
お問い合わせ先 電話0745-67-0015

配置期限 Lot



ニチイ胃腸丸 使用上の注意

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないこと 胃腸鎮痛鎮痙薬
2. 授乳中の人には本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けること

相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること (1) 医師の治療を受けている人。 (2) 発熱を伴う下痢のある人、血便のある人又は粘液便の続く人。 (3) 妊婦又は妊娠していると思われる人。 (4) 高齢者。 (5) 本人又は家族がアレルギー体質の人。 (6) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。 (7) 次の症状のある人。 排尿困難
- (8) 次の診断を受けた人。 心臓病、緑内障
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること
- (1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

裏面につづく

(2) 5～6日間服用しても症状がよくなる場合
3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談すること 口のかわき

その他の注意

母乳がでにくくなることもある。

[用法及び用量に関する注意]

- (1) 用法用量を厳守すること。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

[保管及び取り扱い上の注意]

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 誤用をさけ、品質を確保するため、他の容器に入れ替えないこと。
- (4) 1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用すること。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は使用しないこと。

製造販売元 日本医薬品製造株式会社

奈良県御所市大字古瀬18番地
お問い合わせ先 TEL 0745 (67) 0015