

第2類医薬品

銀粒 五龍丸 5.5

生薬配合はらぐすり



生薬配合はらぐすり

下痢・食あたり

第2類医薬品

銀粒

五龍丸



発売元

和田製薬株式会社  
奈良県御所市池之内340

第2類医薬品

生薬配合はらぐすり

銀粒 五龍円

副作用被害救済制度  
☎0120-149-931

第2類医薬品

銀粒 五龍円

**効能又は効果**

下痢、消化不良による下痢、食あたり、はき下し、水あたり、くだり腹、軟便。

**用法及び用量**

大人(15才以上)	1回 60粒
11才以上15才未満	1回 40粒
8才以上11才未満	1回 30粒
5才以上8才未満	1回 20粒
3才以上5才未満	1回 15粒

1日3回食後服用する。

**服用時の注意**

- (1) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させて下さい。
- (2) 3才以上の幼児に服用させる場合には、薬剤がのどにつかえることのないよう、よく注意して下さい。

配置期限 Lot.

**成分及び分量 1日量(180粒)中**

日局 オウレン末	300mg
日局 オウバク末	900mg
日局 センブリ末	750mg
日局 ロートエキス	30mg
日局 クジン末	450mg
日局 ケイヒ末	300mg
局外生規 ヨウバイヒ末	600mg

添加物としてカンゾウ末、サリチル酸、カルメロースカルシウム、寒梅粉、銀箔

**注意**

- (1) 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないで下さい。
- (2) 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けて下さい。
- (3) 服用が適さない場合があるので、服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
- (4) 服用に際しては、説明文書をよく読んで下さい。
- (5) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。

4包入(1包60粒×4) **¥550**+税

第2類医薬品

生薬配合はらぐすり



下痢・食あたり

銀粒

五龍円



発売元

和田製薬株式会社  
奈良県御所市池之内340

## 効能又は効果

下痢、消化不良による下痢、食あたり、  
はき下し、水あたり、くだり腹、軟便。

## 用法及び用量

大人(15才以上) ..... 1回 60粒  
 11才以上15才未満 ..... 1回 40粒  
 8才以上11才未満 ..... 1回 30粒  
 5才以上 8才未満 ..... 1回 20粒  
 3才以上 5才未満 ..... 1回 15粒  
 1日3回食後服用する。

## 服用時の注意

- (1) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させて下さい。
- (2) 3才以上の幼児に服用させる場合には、薬剤がのどにつかえることのないよう、よく注意して下さい。

配置期限 Lot.

## 成分及び分量 1日量(180粒)中

日局 オウレン末 ..... 300mg  
 日局 オウバク末 ..... 900mg  
 日局 センブリ末 ..... 750mg  
 日局 ロートエキス ..... 30mg  
 日局 クジン末 ..... 450mg  
 日局 ケイヒ末 ..... 300mg  
 局外生規 ヨウバイヒ末 ..... 600mg  
 添加物としてカンゾウ末、サリチル酸、  
 カルメロースカルシウム、寒梅粉、銀箔

## 注意

- (1) 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないで下さい。
- (2) 授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けて下さい。
- (3) 服用が適さない場合があるので、服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
- (4) 服用に際しては、説明文書をよく読んで下さい。
- (5) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。

1包(60粒)入 **¥150** + 税





下痢・食あたりに

銀  
粒 **五龍門**

この説明文書は、服用前に必ずお読み下さい。  
また必要なときに読めるように保管して下さい。

第2類医薬品

## ⚠ 使用上の注意

⊗ **してはいけないこと** (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故がおこりやすくなります。)

1. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないで下さい。  
胃腸鎮痛鎮痙薬、ロートエキスを含有する他の胃腸薬、乗物酔い薬
2. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないで下さい。  
(目のかすみ、異常なまぶしさ等の症状があらわれることがあります。)
3. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けて下さい。  
(母乳に移行して乳児の脈が速くなることがあります。)



## 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。  
(1) 医師の治療を受けている人。  
(2) 発熱を伴う下痢のある人、血便のある人又は粘液便の続く人。  
(3) 妊婦又は妊娠していると思われる人。  
(4) 高齢者。  
(5) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。  
(6) 次の症状のある人。排尿困難  
(7) 次の診断を受けた人。心臓病、緑内障
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
精神神経系	頭痛
泌尿器	排尿困難
その他	顔のほてり、異常なまぶしさ

3. 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。【口のかわき、目のかすみ】
4. 5～6日間服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

## ⚠ その他の注意

母乳が出にくくなることがあります。

## ⚠ 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。
- (2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3) 他の容器に入れ替えないで下さい。
- (4) 1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用して下さい。
- (5) 配置期限の切れた製品は服用しないで下さい。