

止瀉薬

眞光赤玉はら薬

くんだり腹・食あたり

第2類医薬品

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

- 1.本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください
胃腸鎮痛鎮痙薬、ロートエキスを含有する他の胃腸薬、乗物酔い薬
- 2.授乳中の人には本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください
(母乳に移行して乳児の脈が速くなることがあります。)
- 3.服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください
(目のかすみ、異常なまぶしさ等の症状があらわれることがあります。)



相談すること

- 1.次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1)医師の治療を受けている人。
(2)発熱を伴う下痢のある人、血便のある人又は粘液便の続く人。
(3)急性の激しい下痢又は腹痛・腹部膨満・はきけ等の症状を伴う下痢のある人。(本剤で無理に下痢をとめるとかえって病気を悪化させることがあります。)
(4)妊婦又は妊娠していると思われる人。
(5)高齢者。
(6)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(7)次の症状のある人。 排尿困難
(8)次の診断を受けた人。 心臓病、緑内障、甲状腺機能障害
- 2.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
精神神経系	頭痛
泌 尿 器	排尿困難
そ の 他	顔のほてり、異常なまぶしさ

- 3.服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

口のかわき、便秘、下痢、目のかすみ

- 4.5～6日間服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

その他の注意

母乳が出にくくなることがあります。

【成分・分量】1日量(90丸:3420mg)中

タンニン酸ベルベリン ……300mg

ロートエキス5倍散 ……150mg

ゲンノショウコ末 ……1500mg

(ロートエキス30mgに相当する。)

本剤は赤色の丸剤です。添加物として、デヒドロ酢酸Na水和物、アルファー化デンプン、カルメロースCa、沈降炭酸Ca、バレイショデンプン、タルク、酸化チタン、アラビアゴム末、ヒドロキシプロピルセルロース、マクロゴール6000、色素(赤色102号、黄色5号)を含有します。

【効能・効果】

下痢、消化不良による下痢、食あたり、はぎ下し、水あたり、くだり腹、軟便、腹痛を伴う下痢

【用法・用量】

15才以上(大人) ……………1回30丸

11才以上15才未満 ……………1回20丸

8才以上11才未満 ……………1回15丸

5才以上 8才未満 ……………1回10丸

いずれも1日3回を限度とし、服用してください。 服用間隔は4時間以上おいてください。

5才未満の幼児には服用させないでください。

《用法及び用量に関連する注意》

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

本製品についてのお問い合わせは、下記にお願い申し上げます。

美吉野製薬株式会社「お客様相談係」

受付時間 9:00～17:00(土、日、祝日を除く)

〒638-0842 奈良県吉野郡大淀町大岩692

電 話 (0745)67-0144(代)

製造販売元

美吉野製薬株式会社
奈良県吉野郡大淀町大岩692

発売元

バイオゾーン メディカル 株式会社
富山県富山市南央町3番37