

2014年8月改訂（自主改訂）

この説明書は、お薬とともに保管し、ご使用の際にはよくお読みください。

第2類医薬品

下痢、食あたり、水あたり、腹痛を伴う下痢

胃腸アイシン

止瀉薬

- 胃腸アイシンは生薬を基源とした成分よりなる胃腸薬で、すぐれた止瀉鎮痛作用、健胃整腸作用をもっています。
- ベルベリン塩化物水和物はキハダ *Phellodendron amurense* の樹皮等に含まれる有効成分のみを抽出加工したもので胃腸の働きをよくし、健胃、整腸作用があります。
- ロートエキスはロート *Scopolia japonica* の根茎より抽出したエキスで鎮痛、鎮けい作用があります。
- センブリ末はセンブリ *Swertia japonica* の開花期の全草を乾燥粉末としたもので強い苦味があり、苦味健胃及び整腸作用のある生薬です。

⚠ 使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる)

1. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないこと
胃腸鎮痛鎮座薬、ロートエキスを含有する他の胃腸薬、乗物酔い薬

2. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないこと
(目のかすみ、異常なまぶしさ等の症状があらわれることがある。)

3. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けること
(母乳に移行して乳児の脈が速くなることがある。)



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

(1) 医師の治療を受けている人。

(2) 発熱を伴う下痢のある人、血便のある人又は粘血便の続く人。

(3) 急性の激しい下痢又は腹痛・腹部膨満・はきけ等の症状を伴う下痢のある人。
(本剤で無理に下痢をとめるとかえって病気を悪化させることがある。)

(4) 妊婦又は妊娠していると思われる人。

(5) 高齢者。

(6) 葉などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

(7) 次の症状のある人。
排尿困難

(8) 次の診断を受けた人。
心臓病、緑内障

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
精神神経系	頭痛
泌尿器	排尿困難
その他	顔のほてり、異常なまぶしさ

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
口のかわき、目のかすみ

4. 5~6日間服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

その他の注意

母乳が出にくくなることがある

裏面に続く

成分・分量 1日量(18錠)中

センブリ末…………… 50 mg ロートエキス散…………… 300 mg
ペルベリン塩化物水和物… 300 mg

添加物として、カンゾウ末、バレイショデンプン、乳糖水和物、セルロース、デヒドロ酢酸Na、ヒドロキシプロピルセルロース、ステアリン酸Mg、タルク、カルナウバロウを含有します。

用法・用量

次の量を服用してください。

年齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	6錠	
11歳～15歳未満	4錠	3回を限度とし、服用間隔は 4時間以上おくこと
8歳～11歳未満	3錠	
8歳未満		服用しないこと

〈用法に関する注意〉

- (1) 定められた用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

効能・効果

下痢、消化不良による下痢、食あたり、はき下し、水あたり、くだり腹、軟便、腹痛を伴う下痢

保管及び取扱い上の注意

1. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
2. 小児の手の届かない所に保管すること。
3. 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる)
4. 使用期限を過ぎた製品は服用しないこと。
5. 1包を分割した残りを服用する場合には、袋の切り口を折り返して、2日以内に服用すること。



お問い合わせ先

薬王製薬株式会社「お客様相談室」電話0744-33-8855

受付時間 9:00～17:00 (土、日、祝日を除く)

製造販売元 薬王製薬株式会社 奈良県磯城郡田原本町245番地