

服用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また必要な時に読めるよう大切に保管してください。

第2類医薬品

軟便、下痢、食あたりに

NID 正露丸糖衣錠

食物を摂取し、消化・吸収の後、体外に排泄するまでの消化器官による疾患は、実に多種多様です。

暴飲・暴食によるもの、食あたり、水あたり、下痢によるもの等その原因も少なくありません。

消化器官を正常に保ち、栄養状態を良好にして、健康な日常生活をおくることは、

誰しもが念願するところです。

NID正露丸糖衣錠は、平素かかり易い一般的な下痢、食あたり、水あたり、くだり腹等に
優れた効果をあらわします。

△ 使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 発熱を伴う下痢のある人、血便のある人又は粘液便の続く人
- (3) 高齢者

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
消化器	食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。
その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
肝機能障害	全身のだるさ、黄疸(皮ふや白目が黄色くなる)等があらわれる。

3. 5~6日服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

【効能・効果、用法・用量、成分・分量、保管及び取り扱い上の注意、お問い合わせ先については、裏面をご覧ください。】

効能・効果

下痢、消化不良による下痢、食あたり、はき下し、水あたり、くだり腹、軟便

用法・用量

次の量を食後水又は白湯にて服用してください。

年齢	1回量	1日服用回数
大人(15歳以上)	4錠宛	
11歳以上15歳未満	3錠宛	3回
5歳以上11歳未満	2錠宛	
5歳未満	服用しないこと	

- (1)用法及び用量を厳守すること。
- (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。
- (3)服用間隔は4時間以上の間を置くこと。

成分・分量 (12錠中)

成 分	含 量	はたらき
日局 木クレオソート	270mg	腸内の異常発酵を抑制する働き
日局 ゲンノショウコ末	315mg	腸の働きをじすめる働き
オウバク乾燥エキス (原生葉換算量)	315mg (1890mg)	腸の働きを改善し、腸の水分分泌を抑える働き

添加物として、セルロース、アラビアゴム、ブルラン、パレイショテンブン、乳糖、カルメロースCa、二酸化ケイ素、白糖、ゼラチン、タルク、炭酸Ca、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール、酸化チタン、セラック、ヒマシ油、カルナウバロウ、サラシミツロウを含有します。

保管及び取り扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない、湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わる。)。
- (4)ぬれた手で本剤を取り扱わないでください。
- (5)使用期限を過ぎたものは服用しないでください。

お問い合わせ先

製造販売元 渡辺薬品工業株式会社

富山県富山市水橋北馬場1番7 TEL.076-479-9123

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931