

服用前にこの説明書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるように保管してください。

1785
A(0418)

下痢・食あたり・水あたり

ルラトン下痢止めSP錠

止瀉薬

特 徴

どこでも水なしで飲める小型で飲みやすい口腔内崩壊タイプの下痢止め薬です。
突然の下痢や食あたりに、お口の中で素早く溶け、たいへん飲みやすくなっています。

8歳のお子様から服用できる割線入りの錠剤です。

○タンニン酸ベルペリン・・・腸の粘膜の炎症を抑える働きと、腸内の腐敗や異常発酵を抑える作用があります。

○ロートエキス・・・・・・・・消化管のけいれんによる腹痛に対して、鎮痛効果をあらわします。
また、腸の異常収縮における下痢を抑制します。



使用上の注意

してはいけないこと



(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

1. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください。
胃腸鎮痛鎮痙薬、ロートエキスを含有する他の胃腸薬、乗物酔い薬
2. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください。
(目のかすみ、異常なまぶしさ等の症状があらわれることがあります。)
3. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください。
(母乳に移行して乳児の脈が速くなることがあります。)

相談すること



1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 発熱を伴う下痢のある人、血便のある人又は粘液便の続く人。
 - (3) 急性の激しい下痢又は腹痛・腹部膨満・はきけ等の症状を伴う下痢のある人。
(本剤で無理に下痢をとめるとかえって病気を悪化させることがあります。)
 - (4) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (5) 高齢者
 - (6) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (7) 次の症状のある人。排尿困難
 - (8) 次の診断を受けた人。心臓病、緑内障、フェニルケトン尿症
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
精神神経系	頭痛
泌尿器	排尿困難
その他	顔のほてり、異常なまぶしさ

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
口のかわき、目のかすみ
4. 5～6日間服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

その他の注意

母乳が出にくくなる場合があります。

効能・効果

下痢、消化不良による下痢、食あたり、はき下し、水あたり、くだり腹、軟便、腹痛を伴う下痢

用法・用量

1日3回を限度とし、口中で溶かして服用するか、水又はお湯で服用してください。
服用間隔は4時間以上おいてください。

年齢	1回量	1日服用回数
成人（15歳以上）	1錠 	3回を限度とする
8歳以上15歳未満	1/2錠 	
8歳未満	服用しないこと	

<用法・用量に関連する注意>

- (1) 本剤は、定められた用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (3) 本剤は口腔内で容易に崩壊しますが、口腔の粘膜から吸収されることはないで、口中で溶かした後、唾液で飲み込むか、水又はお湯で飲み込んでください。通常の錠剤と同様、そのまま水やお湯で服用しても効果に変わりはありません。
- (4) 1錠を分割した残りを服用する場合には、清潔な紙につつま外箱の中に保管し、2日以内に服用してください。
- (5) 錠剤の取り出し方
右図のように錠剤の入っているPTPシートの凸部を指先で強く押して裏面のアルミ箔を破り、取り出してお飲みください。
(誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながります)

(PTPシートの取り出し図)



成分・分量 1日量（3錠）中

ロートエキス	60mg
タンニン酸ベルベリン	300mg

添加物として、バレイショデンプン、D-マンニトール、ヒドロキシプロピルセルロース、セルロース、タルク、無水ケイ酸、アスパルテーム（L-フェニルアラニン化合物）、1-メントール、ステアリン酸Mg、香料、トコフェロール、その他3成分を含有する。

(成分に関連する注意)

生薬（薬用の草根木皮など）を用いた製品なので、製品によって多少色や味が異なることがありますが、効果には変わりありません。

錠剤が黄色い理由

ハラトン下痢止めSP錠に配合されている「タンニン酸ベルベリン」が黄色い成分なので黄色い錠剤となっています。着色料は配合されていません。

保管及び取り扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わります。）
- (4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。
- (5) 変質の原因となりますので、錠剤の入っているPTP（包装）シートをミシン目に沿って切り離す際などに、服用されない錠剤の裏のアルミ箔に傷をつけないようにしてください。



製造販売元
富山めぐみ製薬株式会社
富山県富山市三番町3-10

本品についてのお問い合わせは、下記にお願いいたします。
富山めぐみ製薬株式会社 お客様相談窓口 ☎076 (421) 5531
受付時間 9:00~17:00（土、日、祝日を除く）