

この説明文書は服用前に必ずお読みください。また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

## 下痢止め薬

下痢・食あたりに

第2類医薬品

# アクロミンカプセルA

下痢・食あたり・はき下し・水あたり…。

これらは日常しばしば起こる病気です。その原因は、食べ過ぎ、冷え、消化不良や食あたりなどの細菌性のものまでさまざまあります。

アクロミンカプセルAは各成分の働きにより、下痢や食あたりなど、不快な症状をすみやかに改善します。

### ⚠ 使用上の注意

#### してはいけないこと ❌

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる)

1. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないこと  
胃腸鎮痛鎮痙薬、ロートエキスを含有する他の胃腸薬、乗物酔い薬
2. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないこと  
(目のかすみ、異常なまぶしさ等の症状があらわれることがある。)
3. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けること  
(母乳に移行して乳児の脈が速くなることもある。)
4. 服用前後は飲酒しないこと
5. 1週間以上継続して服用しないこと

#### 相談すること 🏠

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
  - (1) 医師の治療を受けている人。
  - (2) 発熱を伴う下痢のある人、血便のある人又は粘液便の続く人。
  - (3) 急性の激しい下痢又は腹痛・腹部膨満・はきけ等の症状を伴う下痢のある人。  
(本剤で無理に下痢をとめるとかえって病気を悪化させることがある。)
  - (4) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
  - (5) 小児。
  - (6) 高齢者。
  - (7) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
  - (8) 次の症状のある人。  
排尿困難
  - (9) 次の診断を受けた人。  
心臓病、胃・十二指腸潰瘍、緑内障
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

| 関係部位  | 症 状           |
|-------|---------------|
| 皮 膚   | 発疹・発赤、かゆみ     |
| 精神神経系 | 頭痛            |
| 泌 尿 器 | 排尿困難          |
| そ の 他 | 顔のほてり、異常なまぶしさ |

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること  
口のかわき、目のかすみ

4. 5～6回服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

### その他の注意

母乳が出にくくなることもある。

## 効能

下痢、消化不良による下痢、食あたり、はき下し、水あたり、くだり腹、軟便、腹痛を伴う下痢

## 用法・用量

次の量を、水又はぬるま湯で服用してください。

| 年齢        | 1回量         | 服用回数                                      |
|-----------|-------------|---|
| 成人(15才以上) | 2カプセル       | 1日3回を限度として服用してください。<br>服用間隔は4時間以上おいてください。 |
| 8才～14才    | 1カプセル       |   |
| 8才未満      | 服用しないでください。 |   |

### 〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (3) 右図のようにカプセルの入っているPTPシートの凸部を指先で強く押し、裏面のアルミ箔を破り、取り出してお飲みください。  
(誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながります。)



## 成分・分量 2カプセル中

| 成分名         | 分量    | 作用                                |
|-------------|-------|-----------------------------------|
| アクリノール水和物   | 30mg  | 食あたりなどの原因となる有害な菌に対して優れた殺菌効果があります。 |
| ペルバリン塩化物水和物 | 70mg  |                                   |
| 次硝酸ビスマス     | 200mg | 収れん作用並びに腸内の異常醗酵を抑えます。             |
| ロートエキス      | 20mg  | 腸の緊張をやわらげ、下痢によって起こる腹痛を改善します。      |
| エンゴサク末      | 70mg  |                                   |
| カンゾウ末       | 80mg  |                                   |

添加物:乳糖水和物、セルロース、ステアリン酸Mg、ヒドロキシプロピルセルロース、ゼラチン、ラウリル硫酸Na、青色1号、黄色5号

## 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 使用期限をすぎた製品は服用しないでください。



製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。

小林薬品工業株式会社 お客様相談室

電話：058-278-3933

受付時間：10時～16時(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度のお問い合わせ先

(独)医薬品医療機器総合機構  
☎0120-149-931(フリーダイヤル)

製造販売元

小林薬品工業株式会社

岐阜県岐阜市中鷲1丁目139番地

FOK