

服用前にこの説明文書を必ず読むこと。
また、必要な時に読めるよう大切に保管すること。

第2類医薬品

止瀉薬

マイベリンU

本剤は、黄柏の有効成分であるペルベリンとゲンノショウコエキスを主剤とし、それに腓腸筋(ひちょうきん)痙れんや腸疝(ちょうせん)痛などの痛み止めとして使われた漢方薬「芍薬甘草湯」に従い、芍薬と甘草とを配合し、主として和漢生薬を用いて製した下痢止めです。

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる)

1. 次の人は服用しないこと
透析療法を受けている人。
2. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないこと
胃腸鎮痛鎮痙薬、□-トエキスを含有する他の胃腸薬、乗物酔い薬
3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないこと
(目のかすみ、異常なまぶしさ等の症状があらわれることがある。)
4. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けること
(母乳に移行して乳児の脈が速くなる可能性がある。)
5. 長期連用しないこと



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 発熱を伴う下痢のある人、血便のある人又は粘液便の続く人。
(3) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
(4) 高齢者。
(5) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(6) 次の症状のある人。
排尿困難
(7) 次の診断を受けた人。
心臓病、腎臓病、緑内障
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるため、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
精神神経系	頭痛
泌 尿 器	排尿困難
そ の 他	顔のほてり、異常なまぶしさ

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
□のかわき、便秘、下痢、目のかすみ
4. 5～6日間服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

その他の注意

母乳が出にくくなる可能性がある。

(裏面に続きます)

効能・効果

下痢、消化不良による下痢、食あたり、はき下し、水あたり、くだり腹、軟便、腹痛を伴う下痢

用法・用量

服用間隔は4時間以上おくこと。

年 齢	1 回 量	1日服用回数
15歳以上	3錠	3回
11歳以上15歳未満	2錠	3回
5歳以上11歳未満	1錠	3回
5歳未満	服用しないこと	

- (1) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。
- (2) 用法・用量を厳守すること。
- (3) 錠剤の取り出し方。

図のように錠剤の入っているPTPシートの凸部を指先で強く押し、裏面のアルミ箔を破り、取り出して服用すること(誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながる)。



成分・分量、作用 1日量9錠中に次の成分を含む。

成 分	9錠中	主な作用
ペルベリン塩化物水和物	300mg	殺菌作用があり止瀉作用がある。
ゲンノショウコエキス (ゲンノショウコ7560mgに相当)	1080mg	収れん作用があり腹痛にも効果がある。
シャクヤク末	300mg	痛みをやわらげ、筋肉の痙れんや緊張をほぐす。
甘草エキス粉末 (カンゾウ751mgに相当)	52.5mg	殺菌作用があり炎症をおさえる。
ロートエキス	45mg	胃腸の痙れんをしずめ、腹痛をやわらげる。
メタケイ酸アルミン酸マグネシウム	700mg	胃粘膜の保護・胃酸過多・胸やけ等に効果がある。

添加物：ヒドロキシプロピルセルロース、トウモロコシデンプン、カルメロースCa、ステアリン酸Mg、ヒドロキシプロピルメチルセルロース、アスパルテーム(L-フェニルアラニン化合物)、香料、ビタミンE

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる)。
- (4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないこと。

お問い合わせ先
田村薬品工業株式会社 お客様相談室
06-6203-5151
受付時間 10:00~17:00(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度のお問い合わせ先
(独)医薬品医療機器総合機構
http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html
電話 0120-149-931(フリーダイヤル)

製造販売元 **田村薬品工業株式会社**
奈良県御所市西寺田50