



2013年4月 記載要領変更に伴う改訂

**第2類  
医薬品**

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。また、必要な時読めるよう大切に保管してください。



止瀉薬

# ロペラマック サット

ロペラマックサットは…

- 塩酸ロペラミドが腸に直接作用して、高まったぜん動運動を抑え、下痢を改善します。
- 塩酸ロペラミドが腸において水分・電解質の分泌を抑え、さらに腸への水分吸収を促進し、下痢を改善します。
- 口の中でサッと溶ける錠剤です。

### ⚠ 使用上の注意

#### ❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

1. 次の人は服用しないでください  
本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください  
胃腸鎮痛鎮痙薬
3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください  
(眠気があらわれることがあります。)
4. 服用前後は飲酒しないでください

#### 🗨 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください
  - (1) 医師の治療を受けている人。
  - (2) 発熱を伴う下痢のある人、血便のある人又は粘液便の続く人。
  - (3) 急性の激しい下痢又は腹痛・腹部膨満・吐き気等の症状を伴う下痢のある人。  
(本剤で無理に下痢を止めるとかえって病気を悪化させることがあります。)
  - (4) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
  - (5) 授乳中の人。
  - (6) 高齢者。
  - (7) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
  - (8) 便秘を避けなければならない肛門疾患等のある人。  
(本剤の服用により便秘が発現することがあります。)
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください



関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	便秘、腹部膨満感、腹部不快感、吐き気、腹痛、嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。
イレウス様症状 (腸閉塞様症状)	激しい腹痛、ガス排出(おなら)の停止、嘔吐、腹部膨満感を伴う著しい便秘があらわれる。

症状の名称	症 状
皮膚粘膜眼症候群 (スティーブンス・ジョンソン症候群)、 中毒性表皮壊死融解症	高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、の どの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤等 が持続したり、急激に悪化する。

3. 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください  
便秘
4. 2～3日間服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください

### 〔効 能〕

食べすぎ・飲みすぎによる下痢、寝冷えによる下痢

### 〔用法・用量〕

下記の1回服用量を服用します。服用間隔は4時間以上おいてください。また、下痢が止まった場合は、服用しないでください。

年 齢	1回服用量	1日服用回数
大人(15才以上)	1錠	2回
15才未満	服用しないでください	

### 〔用法・用量に関連する注意〕

(1) 定められた用法・用量を厳守してください。

#### (2) 錠剤の取り出し方

右図のように錠剤の入っているPTPシー  
トの凸部を指先で強く押し、裏面のアルミ  
箔を破り、取り出してお飲みください。  
(誤ってそのまま飲み込んだりすると食道  
粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながり  
ます。)



本剤は壊れやすいため、爪を立てずに指の腹で押し、PTPシー  
トから取り出してください。また、PTPシートから取り出す際、  
アルミ箔が丸く切り取られることがありますので、切り取られ  
たときには、一緒に飲まないようご注意ください。

(3) 本剤は、割れたり欠けたりすることがありますが、効果に変わり  
はありません。割れたり欠けたりした分も含めてお飲みくださ  
い。また、取り出した錠剤は早めにお飲みください。

### 〔成分・分量と働き〕2錠中

成 分	分 量	働 き
塩酸ロペラミド	1mg	腸に直接作用して、高まったぜん動運動 を抑えます。腸の水分・電解質の分泌を 抑え、さらに腸への水分吸収を促進し、 下痢を改善します。

添加物として、エリスリトール、D-マンニトール、ポビドン、サッ  
カリンNa、マクロゴール、ステアリン酸Mg、無水ケイ酸、香料(1-メ  
ントールを含む)を含有します。

### ◎保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所  
に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。  
(誤用の原因になったり品質が変わるおそれ  
があります。)
- (4) 使用期限または配置期限をすぎた製品は、服用しないでください。
- (5) 錠剤を湿気の多い所に放置した場合やわらかくなることがあり  
ますが、効果に変わりはありません。



副作用被害救済制度のお問い合わせ先  
(独)医薬品医療機器総合機構  
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>  
電話 0120-149-931 (フリーダイヤル)

本製品についてのお問い合わせは、お買い求めの  
お店又は下記にお願い申し上げます。  
佐藤製薬株式会社 お客様相談窓口  
電話 03(5412)7393  
受付時間：9:00～17:00(土、日、祝日を除く)

製造販売元  
佐藤製薬株式会社  
東京都港区元赤坂1丁目5番27号