開け口

第3類
医薬品

販売名：ウエストンナチュラル

用法・用量　次の量を1日1回就寝前にコップ1杯の水で服用してください。ただし、初回は最小量を用い、便通の具合や状態をみながら少しずつ増量又は減量してください。

年齢	1回量	服用回数
成人（15才以上）	3～6錠	1日1回
11才～14才	2～4錠	
7才～10才	2～3錠	
5才～6才	1～2錠	
5才未満	×服用しないこと	

<用法・用量に関連する注意>
（1）用法・用量を厳守してください。（2）小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。（3）個人差は大きいですが、早い方では約1～2時間で効果があらわれます。（4）個人差がありますので初回は最小量を用い、便通の具合や状態をみながら少しずつ増量又は減量してください。（5）必ず十分な水と一緒に服用してください。

効能

○便秘　○便秘に伴う次の症状の緩和：頭重、のぼせ、肌あれ、吹出物、食欲不振（食欲減退）、腹部膨満、腸内異常醗酵、痔

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931

使用期限

製造番号

成分・分量　6錠中

酸化マグネシウム……2000mg

添加物：CMC-Ca、ステアリン酸Ca、無水ケイ酸、ケイ酸Ca、セルロース、香料、*l*-メントール、オクテニルコハク酸デンプンNa

<成分・分量に関連する注意>
酸化マグネシウムは天然の成分を用いていますので、製品により錠剤の色調が異なることがありますが、効果には変わりありません。

保管及び取扱い上の注意

（1）直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。（2）小児の手の届かない所に保管してください。（3）他の容器に入れ替えないでください（誤用の原因になったり品質が変わります。）。（4）使用期限をすぎた製品は服用しないでください。（5）水分が錠剤に付着しますと、錠剤表面が変色したりすることがありますので、誤って水滴を落としたり、ぬれた手でふれないでください。

便秘しがちな方へ

1.毎日時間を決めて一定時間トイレに入ることで、排便の習慣が身に付きやすくなります。また、もよおした時、我慢しないことも大切です。2.朝、昼、夕、3食きちんと食べること、バランスのとれた食事をすることが大切です。また、水分をたっぷり摂りましょう。3.軽いストレッチでも構いません、腹筋を鍛えるつもりで運動しましょう。腹部のマッサージも腸を軽く刺激します。

発売元　日新薬品工業株式会社
滋賀県甲賀市甲賀町田堵野80-1

製造販売元　小林薬品工業株式会社
岐阜県岐阜市中鶉1丁目139番地

お問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願いします。
小林薬品工業株式会社　お客様相談室
電話：0120-584-419
受付時間：10時～16時（土、日、祝日を除く）

酸化マグネシウム
便秘薬

150錠

5才から飲める

クセになりにくい

お腹が痛くなりにくい

非刺激性
ウエストンナチュラル

第3類医薬品



原寸大

ご使用に際して、外箱の説明文を必ずお読みください。また、必要な時に読めるよう商品と共に大切に保管してください。

⚠使用上の注意

☒してはいけないこと
（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる）

1.**本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないこと**　他の瀉下薬（下剤）

相談すること

1.**次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること**（1）医師の治療を受けている人。（2）妊婦又は妊娠していると思われる人。（3）高齢者。（4）次の症状のある人。はげしい腹痛、吐き気・嘔吐（5）次の診断を受けた人。腎臓病

2.**服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること**

関係部位	症状
消化器	はげしい腹痛、吐き気・嘔吐
精神神経系	強い眠気、意識がうすれる
循環器	立ちくらみ、脈が遅くなる
呼吸器	息苦しい
その他	筋力の低下、口のかわき

3.**服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること**　下痢

4.**1週間位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること**