

服用に際して、この添付文書をよくお読みください。
また、必要な時読めるよう大切に保管してください。

和漢生薬

通じぐすり 爽通 便秘薬

第2類医薬品

私達は食事によって、体内へ栄養を送り込んでいますが、すべてが吸収されるのではなく、老廃物は体外へ排出しなければなりません。老廃物がたまると体の調子が異常になります。その主な症状が便秘で、そのまま放っておくと身体全体が健康でなくなります。

健康、若さ、美容を保つために毎日の便通が大切です。

本剤は、和漢生薬数種配合により、やさしく、快よい便通が得られます。

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 本剤を服用している間は、他の瀉下薬(下剤)を服用しないでください。
2. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください。
3. 大量に服用しないでください。

■ 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1) 医師の治療を受けている人。(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。(3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。(4) はげしい腹痛、吐き気・嘔吐の症状のある人。
2. 服用後、皮膚に発疹・発赤、かゆみの症状、消化器にはげしい腹痛、吐き気・嘔吐の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
3. 服用後、下痢の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合、又は1週間位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

● 成分・分量 6錠(1日最大服用量)中

ダイオウ末	500mg
アロエ末	500mg
ケンゴシ	250mg
ケイヒ末(矯臭剤)	40mg
カンゾウ末(矯味剤)	70mg
添加物として、バレイシヨデンブ、カルメロースカルシウム、ステアリン酸マグネシウム、セルロース、無水ケイ酸を含有します。	

● 効能

- 便秘
- 便秘に伴う次の症状の緩和：
頭重、のぼせ、肌あれ、吹出物、食欲不振
(食欲減退)、腹部膨満、腸内異常醗酵、痔

● 用法・用量

15才以上 …… 1回1錠～2錠 15才未満 …… 服用しないでください。

1日3回 食間に服用してください。

ただし、初回は最小量を用い、便通の具合や状態をみながら少しずつ増量又は減量してください。

〈用法・用量に関連する注意〉 用法・用量を厳守してください。

※食間とは「食事と食事の間」を意味し、食後約2時間のことをいいます。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。(2) 小児の手の届かない所に保管してください。(3) 誤用をさけ、品質を保持するため、他の容器に入れ替えないでください。(4) 本品は生薬製剤のため、錠剤表面の色が一定でない場合や僅かに斑点を認める場合がありますが、品質に影響がないので、安心して服用してください。(5) 外箱に表示した使用期限内に服用してください。

米田薬品工業株式会社
製造販売元 奈良県高市郡高取町市尾986



本品について お客様相談室 TEL0120-18-3548
のお問合せ先 月～金曜日(祝日を除く) 10:00～16:00

副作用被害救済制度 TEL0120-149-931 19110