で使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

第3類医薬品

# 非刺激性活性酸化マグネシウム便秘薬

スリーエー

# 3Aアクアマク"ネシア

腸を刺激しないからお腹にやさしく、クセになりにくい。

便秘は肌あれ、にきび、吹出物などの原因になるばかりでなく、頭重、腹部膨満、食欲不振、腸内異常醗酵などの不快な全身的症状にまで発展します。

酸化マグネシウムの便秘薬、3A**アクアマグネシア**で、快適な毎日をお過ごしください。

※活性酸化マグネシウムとは保水力の高い酸化マグネシウムのことです。

#### ⚠使用上の注意

# **◯** してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください他の瀉下薬(下剤)



#### 相談すること

- 1.次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
  - (1)医師の治療を受けている人。
  - (2)妊婦又は妊娠していると思われる人。
  - (3)高齢者。
  - (4)次の症状のある人。 はげしい腹痛、吐き気・嘔吐
  - (5)次の診断を受けた人。

腎臓病

2.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症
消化器	はげしい腹痛、吐き気・嘔吐
精神神経系	強い眠気、意識がうすれる
循 環 器	立ちくらみ、脈が遅くなる
呼 吸 器	息苦しい
その他	筋力の低下、口のかわき

3.服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が 見られた場合には、服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者 に相談してください

下痢

4.1週間位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

#### 【効能・効果】

- ○便秘
- ○便秘に伴う次の症状の緩和:頭重、のぼせ、 肌あれ、吹出物、食欲不振、腹部膨満、腸 内異常醗酵、痔

#### 【用法・用量】

次の量を就寝前にコップ1杯の水で服用してください。

ただし、初回は最小量を用い、便通の具合や状態をみながら少しずつ増量又は減量してください。

	年 齢	1 回量	1日服用回数	
	大人(15歳以上)	3~6錠		
	11歳~14歳	2~4錠	1 🗇	
	7 歳~10歳	2~3錠	I L	
ľ	5 歳~ 6 歳	1~2錠		
ľ	5歳未満	服用しないでください		

# ●便秘は腸の水不足

便秘の時、便は水分が不足して硬く、排便しにくい状態になります。そこで充分な水分が与えられれば、便はやわらかくなり、腸を刺激しなくても自然に排便を促すことができます。

3Aアクアマグネシアは、酸化マグネシウムが、浸透圧を利用して腸内に水分を集め、それによって便をやわらかくさせる、栄養素生まれの便秘薬です。腸を刺激しないので、お腹にやさしく、クセになりにくいです。

3Aアクアマグネシアは保水力の高い活性酸化マグネシウムを使用しているので、穏やかな作用で効きます。

## 【お問い合わせ先】

発売元

- (1)購入した薬局·薬店
- (2)佐藤薬品工業株式会社 医薬情報部

TEL 0744-28-0021 受付時間 9:00~16:30(土·日·祝日を除く)

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)用法・用量を厳守してください。
- (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

# 【成分・分量】

6錠中

成 分		含	量
酸化マグネシウム	2000mg		

添加物:セルロース、CMC-Ca、ステアリン酸Ca、I-メントール

## 【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

# ● 効果的な飲み方は

寝る前にコップー杯の水でお飲みください。 眠っている間に酸化マグネシウムが体内の水 分を腸に集め、便をやわらかくするので、朝 には自然な排便ができます。

初回に少量服用し、排便できない時は、用法 用量の範囲内で増量してください。便がゆる くなることがありますが、その場合は次回から 1錠ずつ減らし、服用量を調節してください。

3Aアクアマグネシアは、保水力の高い活性酸化マグネシウムを使用している便秘薬です。

2211

販売元 サンドラッググループ

フジックス株式会社東京都渋谷区代々木5丁目59番5号

製造販売元 佐藤薬品工業株式会社 奈良県橿原市観音寺町9番地の2