



- ◆コラックファイバーは、植物せんい(ブランタゴ・オバタ種皮)が水分を吸収して便をふくらさせ、整腸成分(ケツメイシ乾燥エキス)が腸のはたらきを整えることで、より自然に近いスムーズなお通じを促す植物性の便秘薬です。
- ◆センノシド・カルシウムが腸の運動を改善させます。
- ◆ビタミンB₆が便秘に伴う肌あれや吹出物に効果的です。

⚠ 使用上の注意



ⓧ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

- ① 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください
他の瀉下薬(下剤)
- ② 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください
- ③ 大量に服用しないでください



相談すること

- ① 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (4) 次の症状のある人。
はげしい腹痛、吐き気・嘔吐

- ② 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤・かゆみ
消化器	はげしい腹痛、吐き気・嘔吐

- ③ 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強がみられた場合には、服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

下痢

- ④ 1週間位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

効能

○便秘

○便秘に伴う次の症状の緩和：頭重、のぼせ、肌あれ、吹出物、食欲不振(食欲減退)、腹部膨満、腸内異常発酵、痔

用法・用量

次の量を服用してください。

年令	1回量	服用回数
成人(15才以上)	1~2包	1日2回朝夕の空腹時(又は食前あるいは食間) ただし、初回は最小量を用い、便通の具合や状態を みながら少しづつ增量又は減量してください。
15才未満	服用しないこと	

[注意]

- (1)定められた用法・用量を厳守してください。
- (2)コップ1杯(約180mL)の水又はぬるま湯でかますに服用してください。

成分

1包(2.0g)中

成 分	分 量	はたらき
ブランタゴ・オバタ種皮	1200mg	腸内で水分を吸収して膨潤し、便のカサを 増やし、軟らかくします。
ケツメイシ乾燥エキス	100mg (ケツメイシとして1000mg)	腸のはたらきを整え、便秘を改善します。
センノシド・カルシウム	20mg (センノシドA・Bとして8.14mg)	腸のぜん動運動を改善させます。
チアミン硝化物(ビタミンB₁)	6 mg	腸のはたらきを整えるのを助けます。
バントテン酸カルシウム	7 mg	
ビリドキシン塩酸塩(ビタミンB₆)	12mg	便秘に伴う肌あれや吹出物を改善します。

添加物：赤色102号、黄色5号、青色2号、香料、エチルバニリン、グリセリン、バニリン、プロピレンジコール、白糖

[注意]

本剤の服用により、尿が黄褐色又は赤褐色になることがあります、これは有効成分のセンノシドによるもので、ご心配ありません。

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)
- (4)1包を分割した残りを服用する場合は、袋の口を折り返して保管し、なるべくはやく服用してください。
- (5)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。



この製品についてのお問い合わせは、お買い求めの
お店又は下記にお願い申し上げます。



連絡先 大正製薬株式会社 お客様119番室
電話 03-3985-1800
受付時間 8:30~21:00(土、日、祝日を除く)

大正製薬株式会社
発売元 東京都豊島区高田3丁目24番1号

<http://www.taisho.co.jp/colac/>

日本製薬工業株式会社
製造販売元 愛知県小牧市小木東一丁目186

副作用被害救済制度のお問い合わせ先

(独)医薬品医療機器総合機構 http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html
電話：0120-149-931(フリーダイヤル)