

つらい便秘にも  
植物性便秘薬

食物繊維\*1  
+押し出す生薬\*2

便秘に伴う  
肌あれ等  
成分配合

\*1: プランタゴ・オパタ種皮末 \*2: センシド

新ウイスワン<sup>®</sup>α  
with One

12包

サラサラ顆粒  
ピーチ風味

第2類医薬品



ゼリア新薬

L22

販売名: 新ウイスワンα

第2類医薬品

ゼリア新薬工業株式会社  
東京都中央区日本橋小町10-11  
お薬係相談室 ☎03-3661-2080  
受付9:00~17:50(土・日・祭日を除く)



4 987103 047629

【保管及び取扱い上の注意】(1)直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。(2)小児の手の届かない所に保管すること。(3)他の容器に入れかえないこと。(4)1包を分割して服用した残りは袋の口を折り戻して保管し、出来るだけ早く服用すること。(5)使用期限を過ぎた製品は服用しないこと。

SO

植物性  
便秘薬



新ウイスワン<sup>®</sup>α  
with One

第2類医薬品


12包

開封口

量の調節ができるサラサラ顆粒

第2類医薬品

こだわったのはナチュラル成分処方(食物繊維+押し出す生薬)  
便秘のときの肌あれも気になる方に肌あれケア成分をプラス配合



【成分】1日量3.6g(3包)中 ●プランタゴ・オパタ種皮末 3,000mg ●センシド 123.08mg (センシドA・Bとして48mg) ●サンキライエキス 43.2mg (サンキライ540mgに相当) ●添加物: 乳糖、トメントール、アセシルアムカリウム、香料、ゼラチン、エタノール、パニリン

【成分・分量に関連する注意】●本剤の服用により、尿が黄褐色又は赤色になることがありますが、これは主成分のセンシドによるものですから心配ありません。

【効能・効果】●便秘 ●便秘に伴う次の症状の緩和: 肌あれ、吹出物、頭重、のぼせ、食欲不振(食欲減退)、腹部膨満、腸内異常発酵、痔

【用法・用量】

年齢	1回量	用法
成人(15才以上)	3/4~1包	1日1~3回食後に服用してください。ただし初回は最小量を用い、便通の具合や状態をみながら少しずつ増量又は減量してください。
11才以上~15才未満	1/2~2/3包	
3才以上~11才未満	1/4~1/3包	
3才未満	服用しないでください。	

(3)コップ1杯(約180mL)の水又はぬるま湯でかまずつのおみください。

【用法・用量に関連する注意】(1)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させると。(2)定められた用法・用量を厳守すること。

紙箱  
中仕切り

分包(スティック):  
PE、金属

製造番号  
使用期限  
[年、月]

すてるときには、お住まいの市町村の  
定める区分に従ってください。  
品名コード 4202


① ② ③ ④  
⑤ ⑥ ⑦ ⑧

【使用上の注意】①ではいけないこと(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)1.本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないこと。他の薬下薬(下剤)2.授乳中の人には本剤を服用しないこと。本剤を服用する場合は授乳を避けること。3.大腸に服用しないこと。【妊婦等への注意】1.次の人は服用前に医師・薬剤師又は登録販売者に相談すること。(1)医師の治療を受けている人、(2)妊婦又は妊娠していると思われる人、(3)薬を飲む人、(4)妊婦又は妊娠していると思われる人、(5)次の症状のある人、(6)けいれん、嘔吐、吐き気、嘔吐、2.服用後、次の症状があらわれれば、服用を中止し、この製品を持って医師・薬剤師又は登録販売者に相談すること。

【服用を中止し、この製品を持って医師・薬剤師又は登録販売者に相談すること】

副作用	症状
皮膚	発疹、発赤、かゆみ
消化器	けいれん、嘔吐、吐き気、嘔吐

3.服用後、次の症状があらわれることがあるので、この上訴の症状が出現した場合は、医師・薬剤師又は登録販売者に相談すること。下痢、4.服用後、服用しても症状が改善しない場合は、服用を中止し、この製品を持って医師・薬剤師又は登録販売者に相談すること。



つらい便秘にも 植物性便秘薬

食物繊維\*1 + 押し出す生薬\*2

便秘に伴う肌あれ成分配合

サラサラ顆粒 ピーチ風味 第2類医薬品

新ウイズワン<sup>α</sup> with One

36包

ゼリア新薬



〔保管及び取扱い上の注意〕


- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手のとどかない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れかえないこと。(誤用の原因になったり品質が変わることがある。)
- (4) 1包を分割して服用した残りは、袋の口を折り返して保管し、出来るだけ早く服用すること。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は服用しないこと。

販売名: 新ウイズワン<sup>α</sup> 第2類医薬品 MADE IN JAPAN

4 987103 047636

製造販売元  
ゼリア新薬工業株式会社  
東京都中央区日本橋小舟町10-11  
お客様相談室 ☎03-3661-2080  
受付9:00~17:50(土・日・祝日を除く)  
副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

ウイズワンはゼリア新薬工業(株)の登録商標です。 品名コード 4203



植物性便秘薬 新ウイズワン<sup>α</sup> 第2類医薬品

開封口

量の調節ができるサラサラ顆粒

こだわったのはナチュラル成分処方(食物繊維+押し出す生薬) 便秘のときの肌あれも気になる方に肌あれケア成分をプラス配合

食物繊維  
ブランタゴ・オバタ種皮末  
水分を吸収して膨らみ、便の力を増すとともにやわらかくします。

押し出す生薬  
センノシド  
腸のぜん動運動を高め、弱った腸の働きを復活にします。

肌あれケア成分  
サンキライ  
便秘に伴う肌あれを緩和します。

食物繊維\*1がふくらんで生薬\*2が便を押し出す

〔効能・効果〕  
●便秘●便秘に伴う次の症状の緩和: 肌あれ、吹出物、頭重、のぼせ、食欲不振(食欲減退)、腹部膨満、腸内異常発酵、痔

〔用法・用量〕

年齢	1回量	用法
成人(15才以上)	3/4~1包	1日1~3回食後に服用してください。ただし、初回は最小量を用い、便通の具合や状態をみながら少しずつ増量又は減量してください。
11才以上~15才未満	1/2~2/3包	
3才以上~11才未満	1/4~1/3包	
3才未満	服用しないでください。	

〔用法・用量に関する注意〕(1) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。(2) 定められた用法・用量を厳守すること。

(3) コップ1杯(約 180mL)の水又ははるま湯でかまずにおのみください。

紙 箱中仕切り

分包装(スティック): PE, 金属

製造番号  
使用期限 [年・月]

すてるときには、お住まいの市町村の定める区分に従ってください。



〔使用上の注意〕**【してはいけないこと】**(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる) 1. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないこと 他の瀉下薬(下剤) 2. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けること 3. 大量に服用しないこと


〔相談すること〕 1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること (1) 医師の治療を受けている人。 (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。 (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。 (4) 次の症状のある人。 はげしい腹痛、吐き気・嘔吐 2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること


関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	はげしい腹痛、吐き気・嘔吐

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること 下痢 4. 1週間位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

〔成分〕 1日量3.6g(3包)中  
●ブランタゴ・オバタ種皮末……………3,000mg  
●センノシド……………123.08mg (センノシドA・Bとして48mg)  
●サンキライエキス……………43.2mg (サンキライ540mgに相当)  
添加物: 乳糖、L-メントール、アセスルファムカリウム、香料、ゼラチン、エタノール、バニリン

〔成分・分量に関連する注意〕 ●本剤の服用により、尿が黄褐色又は赤色になることがありますが、これは主成分のセンノシドによるものですから心配ありません。





つらい便秘にも 便秘に伴う肌あれ成分配合  
**植物性便秘薬** 食物繊維\*1 + 押し出す生薬\*2

\*1: プランタゴ・オバタ種皮末 \*2: センシド

新ウイズワン<sup>®</sup>α  
 with One  
 アルファ  
 90包

サラサラ顆粒  
 ピーチ風味  
 第2類医薬品



ゼリア新薬

L22 SO

**〔保管及び取扱い上の注意〕**  
 (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。  
 (2) 小児の手のとどかない所に保管すること。  
 (3) 他の容器に入れかえないこと。(誤用の原因になったり品質が変わることがある。)  
 (4) 1包を分割して服用した残りは、袋の口を折り返して保管し、出来るだけ早く服用すること。  
 (5) 使用期限を過ぎた製品は服用しないこと。

〔成分〕1日量3.9g(3包)中  
 ●プランタゴ・オバタ種皮末…3,000mg  
 ●センシド…123.08mg(センシドA・Bとして48mg)  
 ●サンキライエキス…43.2mg(サンキライ540mgに相当)  
 添加物:乳糖、トメントール、アセチルサリウム、香料、セラチン、エタノール、バニリン

〔成分・分量に関する注意〕●本剤の服用により、尿が黄褐色又は赤色になることがあります。これは主成分のセンシドによるものですから心配ありません。  
 MADE IN JAPAN 販売名: 新ウイズワンα 第2類医薬品  
 製造販売元  
**ゼリア新薬工業株式会社**  
 東京都中央区日本橋小町10-11  
 お客様相談室 ☎03-3661-2030  
 受付9:00~17:50(土・日・祝日を除く)  
 市販薬審査済製薬 06 0120-149-9311  
 ウイズワンはゼリア新薬工業(株)の登録商標です。  
 品名コード 3646

紙 箱 中仕切り  
 包 分包(スティック): 15g、金属  
 製造番号  
 使用期限 [年/月]  
 すぐときには、お住まいの市町村の定める区分に従ってください。



植物性便秘薬 新ウイズワン<sup>®</sup>α 開封口  
 量の調節ができるサラサラ顆粒  
 こだわったのはナチュラル成分処方(食物繊維+押し出す生薬)  
 便秘のときの肌あれも気になる方に肌あれケア成分をプラス配合



**肌あれケア成分**  
 +  
**押し出す生薬**  
 センシド  
 腸のぜん動運動を高め、固まった腸の働きを回復にします。  
**食物繊維\*1がふくらんで生薬\*2が便を押し出す**  
 \*1: プランタゴ・オバタ種皮末 \*2: センシド

〔使用上の注意〕【してはいけないこと】(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる) 1. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないこと。他の瀉下薬(下剤) 2. 授乳中の人には本剤を服用しないこと。本剤を服用する場合は授乳を避けること。3. 大量に服用しないこと。  
 【注意すること】1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること(1) 医師の治療を受けている人。(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。(3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。(4) 次の症状のある人。はげしい腹痛、吐き気・嘔吐 2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること  
 〔関係部位〕 腸  
 〔副作用〕 腹痛、吐き気・嘔吐  
 〔消化器〕 はげしい腹痛、吐き気・嘔吐  
 3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が認められた場合には、服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。下痢 4. 連日服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること  
 〔効果・効果〕 ●便秘 ●便秘に伴う次の症状の緩和: 肌あれ、吹出物、頭重、のぼせ、食欲不振(食欲減退)、腹部膨満、腸内異常発酵、痔  
 〔用法・用量〕

年齢	1回量	用法
成人(15才以上)	3/4~1包	1日1~3回食後に服用してください。
11才以上~15才未満	1/2~2/3包	ただし、初回は最小量を用い、便通の具合や状態をみながら少しずつ増量又は減量してください。
3才以上~11才未満	1/4~1/3包	
3才未満	服用しないでください。	

〔用法・用量に関する注意〕  
 (1) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。(2) 定められた用法・用量を厳守すること。(3) コップ1杯(約180ml)の水又はぬるま湯でかまわずにおのみください。



つらい便秘にも 便秘に伴う肌あれ成分配合  
**植物性便秘薬** 食物繊維\*1 + 押し出す生薬\*2

\*1: プランタゴ・オバタ種皮末 \*2: センシド

新ウイズワン<sup>®</sup>α  
 with One  
 アルファ  
 90包

サラサラ顆粒  
 ピーチ風味  
 第2類医薬品



ゼリア新薬