

販売名: 高砂センナ

第②類医薬品

日本薬局方 **センナ**

容量 500g 刻

Lot

袋の裏面も必ずお読みください。



高砂薬業株式会社

大阪市阿倍野区天王寺町南 2-1-20

—— 保管及び取扱上の注意 ——

1. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
2. 小児の手の届かない所に保管してください。
3. 他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因となったり、品質が変わることがあります)
4. 気密な袋に脱酸素剤を入れて保存性を高めてありますが、開封するとその効果は失われますので、次の点に御注意ください。
 - なるべくお早めに御使用ください。
 - 輪ゴム、クリップ等で確実に封止して保管してください。
(吸湿の防止・虫や異物混入の防止)

◎万一製品に異常がありましたら弊社宛御連絡ください。

日本薬局方

センナ

第②類医薬品

販売名:
高砂センナ

使用上の注意

【してはいけないこと】(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 本剤を使用している間は、次の医薬品は使用しないでください。
 - ・他の瀉下薬(下剤)
2. 授乳中の方は本剤を使用しないか、本剤を使用する場合は授乳を避けてください。
3. [用法・用量]に示す量よりも過剰に服用しないでください。

【相談すること】

1. 次の人は、服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - (1)医師の治療を受けている人。
 - (2)妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3)薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (4)次の症状のある人: はげしい腹痛、吐き気・嘔吐。
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文面を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	はげしい腹痛、吐き気・嘔吐

3. 服用後、次の症状の持続又は増強が見られた場合は、服用を中止し、この文面を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - ・下痢
4. 1週間くらい服用しても症状がよくなるない場合は服用を中止し、この文面を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

【効能・効果】

便秘

便秘に伴う次の症状の緩和: 頭重、のぼせ、肌あれ、吹出物、食欲不振(食欲減退)、腹部膨満、腸内異常発酵、痔

【用法・用量】

年齢	用法・用量
成人 (15歳以上)	1日量1.5g～3gに熱湯約150mLを加え、15分間煮た後に滓(カス)をこして取り去り、なるべく就寝前1回に服用する。ただし、初回は最小量を用い便通の具合や状態をみながら少しずつ増量又は減量する。
15歳未満	服用しないこと。

高砂薬業株式会社

大阪市阿倍野区天王寺町南 2-1-20
お客様相談窓口 ☎ 072-977-7151

副作用被害救済制度

☎ 0120-149-931

<http://www.pmda.go.jp/>